



1º CONGRESSO BRASILEIRO e 4º Simpósio Internacional DE NUTROLOGIA PEDIÁTRICA

Centro de Convenções Centrosul | FLORIANÓPOLIS - SC | 13 a 15/11/14

Trabalhos Científicos

Título: Triage Nutricional De Pacientes Internados Em Hospital Público De Referência Em Pediatria

Autores: VALMIN RAMOS DA SILVA; NATUREZA SANT'ANA MENARIO; SIMONE ERLACHER MEDICI; GREYCE SANCHES MOREIRA DE REZENDE; GUSTAVO CARREIRO PINASCO; LARISSA SOARES BARONE INAFO; SARA ALMEIDA BEZERRA DE OLIVEIRA; ANA LUCIA LEITE CALANZANI; NATHÁLIA CABRAL SOUTO; JANINE PEREIRA DA SILVA

Resumo: Objetivos: Descrever o resultado da triagem nutricional em pacientes pediátricos hospitalizados. Metodologia: Busca ativa para avaliação nutricional de pacientes internados em hospital público de referência em pediatria de Vitória, ES, como atividade da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN), definida pela Resolução 272/98 e RDC-63/00. Obtidos dados de sexo, idade, diagnóstico clínico, peso e estatura, no momento da internação. Na classificação da condição nutricional, utilizou-se o IMC/I e E/I, em score z, referente ao padrão OMS (2006/2007). Realizada análise descritiva e inferencial. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Institucional. Resultados: De abril a dezembro de 2013 foram avaliados 1014 pacientes, sendo 311(30,7%) excluídos por ausência de dados antropométricos, impossibilidade de antropometria e alta hospitalar com menos de 48 horas. Incluídos na análise 703 pacientes (55,6% masculino), com média de idade de $6,0 \pm 5,6$ anos, peso $22,8 \pm 18,7$ Kg e de estatura $106,3 \pm 37,9$ cm. Principais diagnósticos clínicos: asma (32); pneumonia (105); bronquiolite (67) de forma isolada ou associada; câncer (172); neuropatias (15); erros inatos do metabolismo (18); anemias, incluindo falciforme (73); e outros casos como processos infecciosos graves, trauma, doenças genéticas e malformações congênitas (261). Foi diagnosticada desnutrição aguda (73-10,4%), desnutrição crônica (66-9,4%), eutrofia (436-62,0%), risco de sobrepeso (53-7,5%), sobrepeso (36-5,1%) e obesidade (39-5,5%). Desnutrição aguda grave foi diagnosticada em 23 (3,3%), a forma crônica grave, geralmente secundária a doenças crônicas, foi observada em 41 (5,8%). Conclusões: A triagem nutricional diagnosticou desnutrição em 19,8% dos pacientes, enquanto o excesso de peso foi observado em 18,1%, representado por 5,5% de obesidade.