



1º CONGRESSO BRASILEIRO e 4º Simpósio Internacional DE NUTROLOGIA PEDIÁTRICA

Centro de Convenções Centrosul | FLORIANÓPOLIS - SC | 13 a 15/11/14

Trabalhos Científicos

Título: Fatores Associados Ao Diagnóstico Antropométrico De Recém-nascidos

Autores: VANESSA LONDERO; CRISTINA SALING KRUEL; JULIANA SAIBT MARTINS;
ROSIANE FILIPIN RANGEL ; FRANCELIANE JOBIM BENEDETTI

Resumo: Objetivo: avaliar a associação entre o estado nutricional de recém-nascidos de um hospital de Santa Maria com fatores maternos. Metodologia: Trata-se de estudo transversal inserido em uma coorte prospectiva. A amostra foi coletada em hospital público de Santa Maria – RS. Realizado com mães e bebês nascidos no hospital, coletou-se dados por meio de questionário e de prontuário. A amostragem foi por conveniência. Para a classificação dos recém-nascidos (RNs) quanto ao peso, estatura e perímetro cefálico (PC) de nascimento foram inseridos no programa de autoria de Fenton (2013). Foram excluídas as mães com idade gestacional inferior a 36 semanas e as sob tratamento psiquiátrico, os recém-nascidos portadores de necessidades especiais ou que necessitaram de internação em UTI neonatal. As informações obtidas foram armazenadas em um banco de dados e posteriormente foi aplicado o teste qui-quadrado com nível de significância de 5% ($p < 0,05$). Resultados: Foram avaliadas 32 puérperas, com idade média de $23,66 \pm 6,09$ anos, com idade gestacional de $39,06 \pm 1,21$ semanas. Ao associar o estado nutricional dos bebês com as variáveis maternas, não se observou associação estatisticamente significativas, porém houve maior prevalência inadequação de comprimento e PC para as variáveis uso de álcool, 2 gestações anteriores, menor classe sócio econômica e não ter companheiro. Conclusão: as variáveis maternas podem interferem no estado nutricional de nascimento do RN. É imprescindível essas variáveis serem consideradas em futuros estudos, com amostras maiores, bem como sejam observadas na realização do pré-natal.