



1º CONGRESSO BRASILEIRO e 4º Simpósio Internacional DE NUTROLOGIA PEDIÁTRICA

Centro de Convenções Centrosul | FLORIANÓPOLIS - SC | 13 a 15/11/14

Trabalhos Científicos

Título: Aleitamento Materno E Desenvolvimento Motor Em Diferentes Ambientes Intrauterinos

Autores: RAFAELA DA SILVEIRA CORRÊA; VERA LÚCIA BOSA; CLÉCIO HOMRICH DA SILVA; MARCELO ZUBARAN GOLDANI

Resumo: OBJETIVO: avaliar a influência do aleitamento materno no desenvolvimento motor aos três meses de vida em crianças nascidas a termo de diferentes ambientes intrauterinos. MÉTODOS: coorte múltipla, prospectiva, controlada, com cinco grupos de lactentes, filhos de mães dos ambientes intrauterinos: diabetes, hipertensão, tabagistas, lactentes com restrição de crescimento intrauterino idiopático e um grupo controle. O seguimento compreendeu cinco entrevistas (pós parto, 7 e 15 dias, 1 e 3 meses), sendo o desenvolvimento motor avaliado aos três meses utilizando-se a Alberta Infant Motor Scale. O aleitamento materno foi acompanhado em todas as entrevistas e classificado conforme critérios da OMS. A associação do status do aleitamento materno com o desenvolvimento motor foi avaliada pelo teste qui-quadrado. Consideraram-se significativos valores de $p < 0,05$. RESULTADO: arrolaram-se 225 pares mãe-bebê, desses, 82 (36,4%) não realizaram avaliação no terceiro mês. Não foi identificada diferença significativa da média do escore bruto do ALBERTA entre os ambientes intrauterinos ($p = 0,457$). Em relação ao status do Aleitamento Materno na amostra total, observou-se a redução temporal da proporção de crianças em Aleitamento Materno Exclusivo (AME). Aos 15 dias de vida 89 crianças (76,6%) estavam em AME, com um mês de vida, 70 (56,9%) e aos três meses, somente 45 crianças (31,7%). O status do Aleitamento Materno com um mês não se associou ao desenvolvimento motor ($p = 0,406$), bem como aos três meses ($p = 0,332$), independente do ambiente intrauterino. CONCLUSÃO: Os resultados obtidos demonstraram que o aleitamento materno não influenciou o desenvolvimento motor até o terceiro mês de vida.