



1º Simpósio de Aleitamento Materno

DE 10 A 14 DE OUTUBRO - FORTALEZA/CE

Trabalhos Científicos

Título: Frequência De Aleitamento Materno Exclusivo Do Ambulatório Da Terceira Etapa Do Método Canguru, No Momento Da Alta Em Maternidade De Alto Risco

Autores: SAMARAH PAULA NASCENTE JORCELINO VALENTE (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS); NAIRA CHAVES DE MELO GIOIA FONSECA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS); ÁGATHA IARA MINEIRO MOURA FREIRE (MATERNIDADE ANA BRAGA); JERLYANE VERAS FERNANDES (MATERNIDADE ANA BRAGA); LINEYDE NOBRE CABRAL (MATERNIDADE ANA BRAGA); SAMIRA PORTO DE ALMEIDA RIBEIRO (MATERNIDADE ANA BRAGA); CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA (MATERNIDADE ANA BRAGA); JEFFERSON PEREIRA GUILHERME (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS)

Resumo: Objetivo: Descrever a incidência de aleitamento materno exclusivo, misto e artificial dos pacientes prematuros e/ou de baixo peso, atendidos no ambulatório da terceira etapa do método Canguru da Unidade, no momento da alta ambulatorial. Método: Estudo descritivo e retrospectivo, em que os dados de prontuários dos 612 pacientes atendidos na 3ª etapa do método Canguru, durante o ano de 2016, foram transferidos para tabela do Excel 2016 e as frequências de aleitamento materno foram calculadas. Resultados: O Ambulatório da 3ª etapa conseguiu atender 90% dos bebês de baixo peso que nasceram na unidade. Dos 612 pacientes atendidos, 93,3% tiveram alta em aleitamento materno exclusivo e 6,7% em aleitamento materno misto ou sob fórmula artificial exclusiva. Cerca de 70% da amostra é composta por prematuros tardios e apenas um quarto de prematuros de muito baixo peso. Conclusão: A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) e o Método Canguru (MC) são políticas públicas de apoio ao Aleitamento materno que contribuem com a redução da morbimortalidade neonatal. De fato, aumentar as taxas de aleitamento materno exclusivo nos recém-nascidos com menos de 2500g tem sido recomendado pela Rede Brasileira de Pesquisa Neonatal, pela SBP e pelo MS. Amamentar estes pequenos pode ser extremamente desafiador, já que muitos fatores contribuem com seu desmame precoce, porém, é completamente possível, quando estratégias de apoio a amamentação estão implantadas: IHAC, MC, Banco de leite, ambulatório de assistência às dificuldades em aleitamento materno, com equipe multidisciplinar, incluindo consultor em lactação certificado.