



1º Simpósio de Aleitamento Materno

DE 10 A 14 DE OUTUBRO - FORTALEZA/CE

Trabalhos Científicos

Título: Diagnósticos De Enfermagem Relacionados Ao Desmame Precoce No Período Puerperal

Autores: THAÍS AQUINO CARNEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); FERNANDA CAVALCANTE FONTENELE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); ROSY DENYSE PINHEIRO DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); MARIELLE RIBEIRO FEITOSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); ICLEIA PARENTE RODRIGUES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); ANTÔNIA RITA DE FÁTIMA ABREU DE CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); MARIA TEREZA COSTA VIEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); MARIANA DA SILVA DIÓGENES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); MARIA WILLIANY SILVA VENTURA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); ANA KAROLINE XAVIER DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ)

Resumo: OBJETIVO: Identificar a ocorrência dos principais diagnósticos de enfermagem relacionados ao desmame precoce no período puerperal. MÉTODO: estudo documental, quantitativo, envolvendo a pesquisa as fichas de consultas de enfermagem de 63 puérperas, de idades variadas, no período de maio a julho de 2017, no Banco de Leite Humano de uma maternidade terciária de referência no Estado do Ceará. A coleta de dados foi organizada com base nas características definidoras e fatores relacionados dos diagnósticos de enfermagem referentes à amamentação da NANDA International, versão 2015-2017. Comitê de ética: 1281309. RESULTADOS: Diagnósticos de enfermagem identificados foram: dor aguda, amamentação ineficaz e integridade da pele prejudicada. O diagnóstico de dor aguda 29 (46%) apresentou como características predominantes, um comportamento expressivo, com agitação, choro e aparência abatida das puérperas, tendo como causa mais comum, as lesões nos mamilos por posicionamento e pega inadequados. A amamentação ineficaz 24 (38%) teve como fatores relacionados o uso de bico artificial, chupetas e mamadeiras, ansiedade materna, apoio familiar insuficiente e conhecimento deficiente dos pais sobre a importância da amamentação, sendo caracterizada pelo esvaziamento insuficiente das mamas, sinais deficientes de liberação de ocitocina e incapacidade do lactente de manter a pega na mama adequadamente. O diagnóstico de integridade da pele prejudicada 21 (33,3%), pode ser traduzido principalmente, pelo trauma mamilar e fissuras decorrentes da dificuldade na pega e posição do bebê durante as mamadas, levando essas mulheres ao uso de fórmulas infantis e ao desmame precoce. CONCLUSÃO: A enfermagem tem papel fundamental na orientação dessas mulheres no período puerperal, momento de muitas dúvidas e queixas relacionadas ao aleitamento materno. Portanto, uma assistência planejada, utilizando os diagnósticos de enfermagem de maneira direcionada e padronizada pode traçar intervenções e cuidados de enfermagem que possam orientar e prevenir o desmame precoce, estimulando a amamentação exclusiva até os seis meses de idade.