



1º Simpósio de Aleitamento Materno

DE 10 A 14 DE OUTUBRO - FORTALEZA/CE

Trabalhos Científicos

Título: Cuidados De Enfermagem A Mulheres Atendidas No Banco De Leite Humano

Autores: ANA KAROLINE XAVIER DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); ANGELITA LÍVIA DA SILVEIRA BRITO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); FERNANDA CAVALCANTE FONTENELE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); JANAÍNA LANDIM DE SOUSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); LUANA SILVA DE SOUSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); MARIA WILLIANY SILVA VENTURA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); MARIANA DA SILVA DIÓGENES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); NACHIELLE DA SILVA PINHEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); ROSY DENYSE PINHEIRO DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); THAÍS AQUINO CARNEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ)

Resumo: OBJETIVOS: Caracterizar as mulheres atendidas no Banco de Leite Humano e o motivo da procura. Descrever o cuidado de enfermagem realizado. MÉTODO: Desenvolveu-se um estudo documental, com 30 registros de atendimento a mulheres no período de março e abril de 2017, em um Banco de Leite Humano (BLH) na cidade de Fortaleza - CE, aprovado na Plataforma Brasil 1281309. RESULTADOS: Identificar a população que busca atendimento no BLH é necessário para que se possa planejar e avaliar o atendimento realizado. Das 30 fichas avaliadas, observou-se procura devido ingurgitamento mamário 16(53%), dor 16(53%), fissuras 13(43%) e mastites 13(43%). A maioria das mulheres 17(57%) tinham mais de 30 anos, 24(80%) moravam em Fortaleza, 18(60%) tiveram parto cesáreo, 17(57%) mencionaram ter sido feito o pele a pele com recém-nascido na sala de parto, 20(67%) eram primigesta e estavam tendo a primeira experiência em amamentar. Foi evidenciado amamentação ineficaz: relacionada a dor e ansiedade materna, caracterizado por persistência de mamilos doloridos e esvaziamento insuficiente de cada mama. Integridade tissular prejudicada relacionada ao aumento da sensibilidade. Disposição para amamentação caracterizada pelo desejo da mãe de melhorar a capacidade de oferecer o leite materno a criança. Conhecimento deficiente relacionada a informação insuficiente sobre amamentação. Em todos os atendimentos foram realizadas orientações sobre importância da amamentação em livre demanda e informações direcionadas aos casos individuais. Massagem nas mamas em 22(73%) das mulheres. A ordenha manual do leite foi realizada em 21(70%) das mães. Quando necessário, a avaliação médica foi realizada e em alguns casos iniciado tratamento com medicamentos, com acompanhamento de retorno ao banco de leite. CONCLUSÃO: O conhecimento das características das mulheres atendidas no BLH, forneceu subsídios para o desenvolvimento do plano assistencial. O cuidado de enfermagem individualizado oportunizou a solução dos problemas vivenciados.