



# 1º Simpósio de Aleitamento Materno

DE 10 A 14 DE OUTUBRO - FORTALEZA/CE

## Trabalhos Científicos

**Título:** Hipoplasia Mamária, Alergia A Proteína Do Leite De Vaca (Aplv) E Aleitamento Materno(Am):  
Relato De Caso

**Autores:** ANA LUIZA VELLOSO DA PAZ MATOS (INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA/ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA); DOLORES FERNANDEZ FERNANDEZ (INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA); VIVIANE MACHADO DOS SANTOS (INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA)

**Resumo:** INTRODUÇÃO: A hipoplasia mamária é uma causa primária de falha na lactogênese II podendo não haver produção de volume adequado de leite as necessidades do bebê. A etiologia não é clara, clinicamente apresenta-se como mamas tubulares (uni ou bilateralmente), muito espaçadas (4 cm ou mais) ampla aréola, ptose. Diante de uma dificuldade real para amamentar exclusivamente, por que não amamentar inclusivamente? Relato de Caso: Mãe com 30 anos, 1º filho, parto natural domiciliar, com aleitamento imediato. O aleitamento exclusivo era plano e desejo do casal. Bebê evolui até o 2ºmês sem crescimento e desenvolvimento satisfatório, com orientação médica de introdução de fórmula láctea desde a primeira avaliação. Mãe procura Banco de Leite Humano (BLH) inconformada com a ideia da possibilidade de não amamentar exclusivamente. Referia uso de próteses mamárias desde final da adolescência, inicialmente sem referir motivação. Após ampla anamnese, esclarecido motivação para próteses=deformidades mamárias. Ultrassonografia: reduzido tecido glandular bilateralmente. Iniciado fórmula láctea (FL) como complemento (sonda/peito), desenvolveu APVL, inicia hidrolisado e mantém AM. ascensão da curva de crescimento para normalidade. Aos 5 meses e meio, iniciado dieta complementar e desmame progressivo do hidrolisado, até retirada do mesmo. AM mantido até o 3ºano. Bebê jamais utilizou mamadeira. (arquivo: vídeos/fotos) Discussão: A hipoplasia mamária é uma ocorrência rara, que resulta em diminuição na produção do leite, se não reconhecida pode trazer prejuízo ao crescimento e desenvolvimento do bebê. O exame pré-natal das mamas, pode exibir sinais clínicos. No caso relatado, o uso de prótese de silicone dificultou a princípio a suspeita. Diante de uma paciente usando prótese mamária, é importante investigar a razão da colocação. Resultado: Diante do diagnóstico de hipoplasia mamária o ideal do aleitamento materno exclusivo por seis meses não foi possível, porém o desejo e persistência dos pais e acompanhamento profissional bem conduzido possibilitou o ALEITAMENTO INCLUSIVO.