



1º CONGRESSO SUL-AMERICANO, 2º CONGRESSO BRASILEIRO E 3º CONGRESSO PAULISTA DE
Urgências e Emergências Pediátricas
02 a 05 de maio de 2018 - Centro de Convenções Frei Caneca - São Paulo - SP

Trabalhos Científicos

Título: Qual A Pneumopatia Pediátrica Mais Atendida Nas Emergências Hospitalares Por Região Brasileira E Sexo Nos Últimos 5 Anos?

Autores: CAMYLLA SANTOS DE SOUZA; LARA DIAS ALMEIDINHA; PATRICIA FRAGA PAIVA; ADELMO ISAAC MEDEIROS AVELINO; MARCELA ACCARI DE ALMEIDA; JOÃO DAVID DE SOUZA NETO

Resumo: INTRODUÇÃO: No Brasil, as taxas de morbimortalidade infantil por pneumopatias variam por região, sexo e idade, entre outros indicadores. Dessa forma, se observa a importância dos estudos e trabalhos que apontam para os fatores sociais, além dos fatores demográficos e econômicos, na determinação da saúde infantil. OBJETIVO: Analisar o perfil epidemiológico das pneumopatias mais atendidas nas emergências hospitalares no Brasil nos últimos 5 anos. METODOLOGIA: Estudo transversal, descritivo e retrospectivo, constituído através da base de dados do DATASUS. RESULTADOS: O Ministério da Saúde reportou, no período de 2013-2017, na faixa etária menor de 1 ano até 19 anos, em caráter de urgência, 1.294.121 autorizações de internação hospitalar (AIH) para o sexo masculino (Sudeste/SE 434.469; Nordeste/NE 393.893; Sul/S 204.485; Norte/N 154.072 e Centro-Oeste/CO 107.202) e 1.051.688 AIH (SE 352.733; NE 321.152; S 164.251; N 127.885 e CO 85.667) para o feminino em decorrência de doenças do aparelho respiratório. Na faixa etária indicada, à luz das enfermidades respiratórias inferiores mais prevalentes, tem-se a pneumonia ocupando a 1ª posição, 702.242 AIH para os meninos (SE 240.685; NE 205.475; S 106.149; N 88.013 e CO 61.920) e 589.412 AIH para as meninas (SE 205.416; NE 171.228; S 88.771; N 72.921; CO 51.076). Na 2ª posição, identifica-se a asma, totalizando 193.975 AIH masculinas (NE 80.457; SE 53.948; S 27.160; N 21.045 e CO 11.365) e 155.775 AIH femininas (NE 64.377; SE 42.703; S 21.752; N 18.235; CO 8.708). Em 3º, está a bronquite e bronquiolite aguda, apresentando 142.962 AIH para garotos (SE 62.765; NE 28.493; S 26.762; N 13.700; CO 11.242) e 100.913 AIH para garotas (SE 44.148; NE 19.702; S 18.722; N 10.215; CO 8.126). Em 4º lugar, a influenza computou 24.789 AIH masculinas (NE 12.814; S 4.591; SE 3.189; N 3.142; CO 1.053) e 21.824 AIH femininas (NE 11.550; S 3.873; SE 2.772; N 2.681, CO 948). CONCLUSÃO: Sendo assim, a pneumopatia mais frequente em crianças nos atendimentos de emergência em todas as regiões brasileiras é a pneumonia, seguida de asma, bronquite/bronquiolite aguda e influenza. Quanto ao parâmetro sexo, o masculino foi mais prevalente em todas as regiões e em todas as enfermidades.