



1º CONGRESSO SUL-AMERICANO, 2º CONGRESSO BRASILEIRO E 3º CONGRESSO PAULISTA DE
Urgências e Emergências Pediátricas
02 a 05 de maio de 2018 - Centro de Convenções Frei Caneca - São Paulo - SP

Trabalhos Científicos

Título: Acidente Vascular Encefálico Isquêmico Secundário Ao Herpes Zoster Em Paciente Pediátrico

Autores: DÉBORHA CRYSTINE BARBOSA LOPES; JANINE HORSTH SILVA; GABRIELA BASTOS DE CASTRO EUFRASIO; JOÃO PAULO GOMES DE OLIVEI

Resumo: INTRODUÇÃO: O acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) na faixa etária pediátrica é patologia incomum associada a condições de base como cardiopatias e doenças hematológicas, podendo também ser relacionado a coagulopatias, doenças autoimunes, vasculites pós-infecciosa, dentre outras etiologias. OBJETIVO: Relatar um caso raro de AVCi por vasculite pós-infecciosa por Herpes Zoster (HZ) em paciente pediátrico, cuja investigação etiológica confirmou a infecção prévia e excluiu as demais causas comuns nessa faixa etária, tornando provável o diagnóstico. METODOLOGIA: Revisão de prontuário. RESULTADOS: Paciente de 9 anos, sexo feminino, histórico de varicela sem complicações há 7 anos e de herpes zoster em região ocular esquerda, acometendo o ramo oftálmico do nervo trigêmeo, há 4 meses, resolvido após tratamento com Aciclovir. Após esse período, evoluiu com quadro súbito de síncope transitória, hemiparesia e hemiplegia à direita, desvio de rima labial e afasia de Broca. Foi comprovada oclusão da artéria cerebral média esquerda e infartos agudos no território de ramos lenticuloestriados, através de Ressonância Magnética e Angiorressonância de crânio. A infecção prévia foi comprovada com sorologias específicas e as demais etiologias prováveis descartadas com exames dirigidos. A paciente foi tratada em unidade de terapia intensiva evoluindo com recuperação neurológica completa até o momento. CONCLUSÃO: O AVCi relacionado à vasculite pós-infecciosa por HZ na infância é muito pouco relatado na literatura. Há evidências de que o HZ invade o sistema nervoso central por contiguidade, provocando angéite granulomatosa e trombose arterial, e de que o acometimento do ramo oftálmico do trigêmeo aumente 30% a chance de AVCi. Nesse relato demonstramos essa rara, e potencialmente grave, complicação de HZ na infância e a importância de realizar uma história clínica pormenorizada, exames laboratoriais e de imagem para a elucidação etiológica.