



1º CONGRESSO SUL-AMERICANO, 2º CONGRESSO BRASILEIRO E 3º CONGRESSO PAULISTA DE
Urgências e Emergências Pediátricas
02 a 05 de maio de 2018 - Centro de Convenções Frei Caneca - São Paulo - SP

Trabalhos Científicos

Título: Evolução Temporal Da Incidência De Pneumonia Em Menores De 5 Anos No Estado De Sergipe Entre Os Anos De 2005 E 2015

Autores: AMANDA PEREIRA GOMES DE MORAES; LILIAN DE MELO LUCENA; JEVERTON DE SANTANA SANTOS; JAMYLLÉ SOUZA RODRIGUES; ADRIANA BARBOSA DE LIMA FONSECA; LUCAS RIBEIRO MARONEZE; ISADORA ARCHANJO F BRAGA; YANA PAULA ALMEIDA M CHAVES; GABRIELLA GUIMARÃES GARCIA; ELIZABETE FRANÇA EMÍDIO; GISELE ROSA BOAVENTURA FERR

Resumo: INTRODUÇÃO: Pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões provocada pela penetração de um agente infeccioso ou irritante (bactérias, vírus, fungos e por reação alérgica), no espaço alveolar. Cerca de 10 a 20% das pneumonias em crianças evoluem desfavoravelmente, contabilizando 1,2 milhão de óbitos por ano. No início da década de 2000, o Brasil concentrava grande parte dos casos de pneumonia adquirida na comunidade (PAC) em menores de 5 anos de idade em todo o mundo. Apesar do número de crianças com pneumonia estar diminuindo a cada ano, ainda é a principal causa de mortes de crianças menores de 5 anos, causando mais mortes infantis do que o HIV, a malária e o sarampo juntos. Dessa forma, analisar a taxa de óbitos por pneumonia nessa população é fundamental para a elaboração de estratégias para melhoria do cuidado em saúde. OBJETIVO: Descrever a tendência no número de óbitos por pneumonia em menores de 5 anos no Estado de Sergipe e apontar a incidências desses óbitos por regiões de saúde. METODOLOGIA: Estudo de natureza descritiva, realizado através de pesquisa ativa em banco de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS) conectado no sistema TabNet Win32. As variáveis de busca foram óbitos por residência, por região de saúde e segundo causas evitáveis (pneumonia), faixa etária < 5 anos e sexo, no período de 2005 a 2015. RESULTADOS: Entre os anos de 2005 e 2015 houve um total de 407 óbitos, sendo 51% do sexo masculino e 49% feminino. Além disso, há uma tendência linear decrescente ocorrendo no estado de Sergipe dos óbitos por pneumonia em <5 anos, iniciando com 51 óbitos anuais em 2005 e chegando a 23 óbitos no ano de 2015. Das regiões de saúde nos 10 anos, Aracaju teve a maior taxa com 23% dos óbitos, seguido de Lagarto e Nossa Senhora do Socorro, ambos com 15% dos óbitos. CONCLUSÃO: A pneumonia caracteriza-se como uma urgência em saúde na pediatria, especialmente nas crianças < 5 anos. A série temporal evidenciou decréscimo no número de óbitos e isso pode ser reflexo da atuação de diversos setores da saúde que buscam a melhoria do cuidado em saúde. A idade não mostrou-se como um fator de prognóstico para o óbito por pneumonia e as regiões de maior incidência condizem com os polos de saúde e concentração populacional. Por fim, esses dados podem refletir um melhor preparo dos profissionais de saúde e da rede de atenção à saúde mediante o reconhecimento e tratamento precoce dessa urgência médica.