



1º CONGRESSO SUL-AMERICANO, 2º CONGRESSO BRASILEIRO E 3º CONGRESSO PAULISTA DE
Urgências e Emergências Pediátricas
02 a 05 de maio de 2018 - Centro de Convenções Frei Caneca - São Paulo - SP

Trabalhos Científicos

Título: Farmacodermia, Um Desafio Diagnóstico - Relato De Caso.

Autores: VIVIAN BRUSCHINI PACKER; CAROLYNNE LELIS SILVA; DIEGO DOVIDIO SANTOS; ANTÔNIO SEBA JUNIOR

Resumo: INTRODUÇÃO: Farmacodermia consiste em erupção cutânea decorrente de uma reação alérgica provocada pelo uso de medicamentos, sendo antibióticos, anti-inflamatórios, quimioterápicos, anticonvulsivantes e psicotrópicos os mais comuns. OBJETIVO: Elucidar a importância do diagnóstico precoce e a suspensão imediata da medicação em uso, a fim de evitar complicações e diminuir o curso da manifestação clínica. METODOLOGIA: Relato de caso de ABSMM, branco, feminino, 4 meses, internada devido quadro súbito de eczema descamativo e pruriginoso distribuído em membros, tronco, dorso, nádegas e região genital, poupando face, mucosa oral e região plantar, não apresentou febre e nem comprometimento do estado geral. Paciente atópica, alérgica a dipirona e uso prévio de Amoxicilina via oral há aproximadamente 4 semanas devido quadro de infecção de vias aéreas superiores. Em aleitamento artificial, mãe negava uso de demais medicações, produtos tópicos e ingesta alimentar bem como outros casos na família. RESULTADOS: Realizado biópsia da pele, coxa direita, no dia 18/09/2017 cuja análise microscópica demonstrou presença de importante crosta fibrinoleucitária em camada córnea, epiderme caracterizada por ceratinócitos apoptóticos e degeneração da camada basal, acantose irregular da epiderme e derme papular com edema e discreto infiltrado inflamatório linfomononuclear perivascular – achados histológicos sugestivos de Síndrome de Stevens-Johnson associada à infecção secundária. CONCLUSÃO: O diagnóstico do caso acima foi de eritema multiforme com apresentação menor, uma vez que o acometimento ficou restrito a pele, a paciente apresentou poucos sintomas gerais e melhor evolução do quadro. Fez uso de Predsim associado à Hixizine e Cefalexina via oral, óleo de girassol tópico após banho, realizado pela equipe de enfermagem de maneira rápida, água morna e sabonete glicerinado. Recebeu alta após remissão do quadro e encaminhada para seguimento ambulatorial.