



10^o Congresso
Brasileiro de
**Reumatologia
Pediatria**
DE 10 A 14 DE OUTUBRO - FORTALEZA/CE

Trabalhos Científicos

Título: Efetividade Do Uso De Corticoterapia Intra-Articular Em Pacientes Portadores De Artrite Idiopática Juvenil Relacionada A Entesite (Are)

Autores: RAFAELA WAGNER (HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE); INGRID HERTA ROTSTEIN GREIN (HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE); MARCIA BANDEIRA (HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE); CHRISTINA FEITOSA PELAJO (HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE)

Resumo: Introdução: A corticoterapia intra-articular (CIA) é comprovadamente uma terapia efetiva na Artrite Idiopática Juvenil (AIJ). No entanto, o benefício do seu uso em todos os subtipos de AIJ não foi bem documentado, e seu uso ainda é controverso, especialmente no subtipo artrite relacionada à entesite (ARE). Objetivo: Este estudo objetivou avaliar a efetividade da CIA em pacientes com ARE, em comparação aos subtipos Poliarticular e Oligoarticular. Ainda, buscamos correlacionar a positividade para o HLA-B27 em pacientes com ARE à resposta ao procedimento. Métodos: Foram selecionados e revisados 149 prontuários de pacientes portadores de AIJ, acompanhados em um serviço de reumatologia pediátrica do sul do Brasil, submetidos à CIA no período de jan/2011 a jan/2016. Destes, 88 pacientes foram excluídos da amostra. Dos pacientes selecionados, foram analisadas e incluídas 113 intervenções (CIA). Os pacientes foram considerados como respondedores caso apresentassem resolução completa da artrite na articulação submetida à CIA, ou seja, ausência de edema ou dor e limitação ao movimento, durante a reavaliação realizada após 30 dias (± 7 dias). Resultados: Ao compararmos os três subgrupos quanto a resposta à CIA, uma uniformidade foi observada, com todos os subgrupos apresentando resposta positiva ao procedimento em torno de 70% ($p = 0,922$). A resposta à CIA em pacientes com ARE HLA-B27 negativo foi satisfatória em 100% dos casos, enquanto apenas 61% dos pacientes com ARE HLA-B27 positivo obtiveram remissão da artrite após o procedimento ($p = 0,272$), indicando uma possível tendência. Conclusões: Não observamos diferença de resposta à CIA nos pacientes portadores de AIJ Oligoarticular, Poliarticular e ARE. Ainda, pudemos registrar uma tendência à redução da resposta ao procedimento nos pacientes portadores de AIJ subtipo ARE HLA-B27 positivo, tendência esta que poderia ser confirmada com a ampliação da amostra estudada.