



12º CONGRESSO BRASILEIRO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA EM PEDIATRIA

27 A 30 DE ABRIL DE 2012 | FECOMÉRCIO - SÃO PAULO

Trabalhos Científicos

Título: Incidência De Anafilaxia E Urticária Em Pronto Atendimento De Hospital Pediátrico

Autores: MARISA LAGES RIBEIRO (HOSPITAL INFANTIL SÃO CAMILO); MARILENE ARANTES (HOSPITAL INFANTIL SÃO CAMILO); ANA PAULA NUNES GRANATO (HOSPITAL INFANTIL SÃO CAMILO); ELIÂNE DAS GRAÇAS PEREIRA GUIMARÃES (HOSPITAL INFANTIL SÃO CAMILO)

Resumo: Anafilaxia e urticária em pronto atendimento de Belo Horizonte: avaliação durante 1 ano
Objetivo Avaliar a incidência e analisar os casos de anafilaxia e urticária atendidos em pronto atendimento de hospital pediátrico de Belo Horizonte. Métodos Realizado estudo transversal descritivo no período de março de 2011 a março de 2012 envolvendo os pacientes que precisaram ser medicados na unidade de urgência com adrenalina, anti-histamínicos e e ou corticóide. Foram excluídos pacientes que receberam medicação apenas para quadros respiratórios. Resultados Durante este período foram realizados 162.544 atendimentos pediátricos ambulatoriais neste hospital infantil e 483 casos preencheram os critérios de inclusão. 55,9% dos pacientes eram do gênero masculino. Idade média e mediana foram respectivamente de 5 anos e 8 meses e 4 anos e dez meses. A maioria dos pacientes procurou atendimento nas primeiras 24 horas de início dos sintomas. Urticária aguda com ou sem angioedema associado foi o principal diagnóstico, acometendo cerca de 75% dos pacientes, enquanto angioedema isolado ocorreu em 3,3%. 4,5% dos pacientes apresentaram anafilaxia. Os principais agentes desencadeantes dos quadros de anafilaxia e urticária, segundo suspeita familiar, foram medicamentos, alimentos e picada de insetos. Foram diagnosticados também exantema viral, prurigo, dermatite atópica, varicela, além de outros. Conclusões A urticária representa importante causa de atendimento em serviço de urgência pediátrico. A anafilaxia, apesar de menos frequente, deve ser suspeitada na presença de sintomas sistêmicos associados à urticária, sendo necessário o treinamento da equipe de saúde neste processo para tratamento imediato.