12.º Congresso Brasileiro de
Terapia Intensiva Pediátrica
11.º Congresso da Sociedade LatinoAmericana de
Cuidados Intensivos Pediátricos
13 a 16 de junho de 2012
São Paulo - SP

Trabalhos Científicos

Título: Aplicación De Dos Escalas De Mortalidad En La Unidad De Cuidados Intensivos Pediátricos Del Hospital Nacional De Itaugua

Autores: JORGE GARCIA (HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA); NORMA CRISTINA PANIZZA (HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA); LIZETTE HEINICHEN (HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA); NORMAN VALDEZ (HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA); ESMILCE FARIÑA (HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA); LILIANA LAMAN (HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA)

Resumo: Introducción: La valoración de la gravedad así como la inestabilidad clínica y pronóstico son los principales desafíos a enfrentar en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), requiriendo de una evaluación eficaz y continua en pacientes en estado crítico. Una de las formas de hacerlo es aplicando las escalas de pronóstico de gravedad: Riesgo de Mortalidad Pediátrico (Pediatric Risk of Mortality, PRISM) y el Índice de Mortalidad Pediátrico (Pediatric Index of Mortality, PIM). Estas escalas permiten cuantificar y estimar la probabilidad de muerte en pacientes ingresados a una UCIP. Objetivos: Evaluar la gravedad al ingreso de los pacientes en la UCIP, a través de los valores del PRISM y PIM. Comparar la puntuación estimada por ambas escalas en los grupos de supervivencia y óbito. Material y métodos: Pacientes internados en la UCIP del Hospital Nacional de Itaugua entre los meses de enero del 2010 a enero del 2011. Estudio retrospectivo descriptivo de corte transversal. Recolección de datos a través de fichas técnicas. Resultados: De los 216 pacientes ingresados a la UCIP se incluyeron 129 pacientes, se registraron 8 óbitos. El sexo masculino representó el 79/129 (61%) de la población. El 94/129 (73%) provenían del área rural. La media de edad fue de 3,8 años. La media de los días de permanencia en la UCIP fue de 10,7 días. En los que sobrevivieron la puntuación media del PRISM fue de 15,2 puntos y la puntuación media de PIM fue de 2,9. La puntuación media del PRISM en los óbitos registrados fue de 28,8 puntos; la puntuación media del PIM fue de 5,75 puntos. Conclusión: Las dos escalas fueron útiles en la valoración de la gravedad y estimación de la mortalidad en la población estudiada. Comparando la puntuación de ambas escalas en los sobrevivientes y óbitos, se observó mayor gravedad, riesgo de mortalidad y tiempo de permanencia en aquellos con puntuaciones elevadas.