



12.º Congresso Brasileiro de  
**Terapia Intensiva Pediátrica**  
11.º Congresso da Sociedad LatinoAmericana de  
**Cuidados Intensivos Pediátricos**  
13 a 16 de junho de 2012  
São Paulo - SP

### Trabalhos Científicos

**Título:** Saúde Mental E Unidade De Terapia Intensiva Pediátrica: Desafio Ou Possibilidade?

**Autores:** MONALISA DE CÁSSIA FOGAÇA (UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO); REGINA GRIGOLLI CESAR (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO); LUCIANE MARTINELLI (UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO); ROSANA ZIMBARDI MARTINS (UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO); JULIA DE CÁSSIA DA SILVA (UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO); ANDRÉ BORGES MARQUES DOS SANTOS (UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO); MÁRCIA RODRIGUES MESSIAS DOS SANTOS (UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO); PATRÍCIA SALDANHA DE LIMA (UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO); RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS (UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO); NAYARA GOMES DE SOUZA (UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO)

**Resumo:** Objetivo: Avaliar a saúde mental de profissionais da saúde que trabalham em UTI Pediátrica. Método: Estudo transversal incluindo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos e auxiliares de enfermagem que trabalham em hospital-escola na cidade de São Paulo, em UTI Pediátrica. A amostragem foi por conveniência, onde 32 profissionais responderam a dois questionários: inventários de depressão e ansiedade de Beck. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da universidade sob o nº 447751. O intervalo de confiança para a média foi construído com 95% de confiança com bases na tabela de Distribuição Normal. Resultados: Em relação ao inventário de ansiedade conclui-se com 95% de confiança que a média para o nível de ansiedade está em um IC (intervalo de Confiança) de  $6,68 < \mu < 7,69$ , ou seja, os profissionais alocados nesta unidade apresentam o nível mínimo de ansiedade, obedecendo ao ponto de corte de escores de 0 a 10 para este nível. Obteve-se, também com mesmo nível de confiança, o intervalo de  $7,31 < \mu < 8,19$  para depressão, ou seja, o nível mínimo em relação ao ponto de corte de escores de 0 a 11, para pacientes psiquiátricos, quando a versão em português é aplicada em relação aos dois inventários. Conclusão: Apesar do número limitado de participantes, o que dificulta a generalização de dados para profissionais da saúde que trabalham em UTI Pediátrica, os dados retratam o perfil de uma unidade de cuidados intensivos, mostrando um perfil organizacional com baixa estimativa para transtornos psiquiátricos.