12.º Congresso Brasileiro de
Terapia Intensiva Pediátrica
11.º Congresso da Sociedad Latinoamericana de
Cuidados Intensivos Pediátricos
13 a 16 de junho de 2012
São Paulo - SP

Trabalhos Científicos

Título:

Autores: THAÍS SALIM (INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA MARTAGÃO GESTEIRA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO); CLEYDE VANZILLOTTA (INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA MARTAGÃO GESTEIRA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO); ANA CRISTINA CISNE FROTA (INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA MARTAGÃO GESTEIRA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO); THALITA FERNANDES DE ABREU (INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA MARTAGÃO GESTEIRA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO); VANESSA COSTA SOARES (INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA MARTAGÃO GESTEIRA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO)

Resumo: Introdução : Staphylococcus aureus meticilino-resistentes adquiridos na comunidade (CA-MRSA) têm exibido uma combinação de fatores de virulência e características de resistência associadas a elevada morbimortalidade na comunidade. Epidemias de furunculose e casos de infecções invasivas pulmonares graves em pessoas jovens e saudáveis têm sido preocupantes. Discussão do caso: A.C.S.D., 1 ano, feminino, previamente saudável, apresentou trauma torácico fechado, evoluindo com febre, pneumonia, abscesso local com drenagem espontânea. Fez uso de penicilina cristalina e oxacilina por 48 horas no hospital de origem. Evoluiu com febre persistente, derrame pleural, insuficiência respiratória, sendo transferida para UTIP. Realizadas intubação orotraqueal, drenagem torácica, troca de antibioticoterapia para cefepima e vancomicina. Ecocardiograma evidenciou derrame pericárdico laminar. Evoluiu com choque séptico. Isolado líquido pleural CA-MRSA cepa: Clone Oceania Southwest Pacific-OSP ST30-SCCmecIV produtora Leucocidina Panton-Valentine (PVL). Suspensa cefepima, mantida vancomicina e associado sulfametoxazol-trimetoprim (SMX-TMP) por febre persistente e pneumonia associada à ventilação mecânica por S.maltophilia. Após 27 dias, vancomicina substituída por clindamicina por reduzir produção de PVL. Extubada após 35 dias de ventilação mecânica. Alta hospitalar após 53 dias internação, com SMX-TMP oral, sem sequelas. Realizada descolonização. Rastreamento de contatos negativo. Comentários: Epidemiologia global do MRSA comunitário é heterogênea, com diferenças geográficas dos tipos e frequências de clones predominantes. Há maior frequência de cepas produtoras de toxinas (PVL) nas amostras SCCmecIV, cursando com maior incidência e gravidade de doenças invasivas, como pneumonias necrotizantes. Vigilância da resistência microbiana é fundamental para orientar seleção da antibioticoterapia empírica. Incidência no Brasil ainda não estudada, devendo-se considerar possibilidade de CA-MRSA em estafilocócios graves.