



12º COBRAPEM

Congresso Brasileiro Pediátrico
de Endocrinologia e Metabologia

31 de maio a 03 de junho de 2017

Rio de Janeiro . RJ

Trabalhos Científicos

Título: Puberdade Precoce Periférica Por Teratoma Ovariano: Relato De Caso

Autores: JULIETA ALICE MORENO RODRIGUES; VIVIANE CASSIA BARRIONUEVO JAIME; KAROLINE VIANA NÓBREGA; ÉRIKA DE LIMA CARNEIRO; MÉRCIA CARDOSO OLIVEIRA GOMES; ANA CAROLINA AMORIM GOMES DE MELO; KEILA JULIANA CARVALHO FERNANDES DE ANDRADE; ILUSKA ALMEIDA CARNEIRO MARTINS DE MEDEIROS; JENNER CHRYSTIAN VERÍSSIMO DE AZEVEDO; RICARDO FERNANDO ARRAIS

Resumo: INTRODUÇÃO: O teratoma imaturo é um tumor incomum, menos de 1% dos tumores ovarianos, sendo o segundo tumor de células germinativas mais frequente. Representa entre 10% e 20% de todas as neoplasias ovarianas de mulheres até 20 anos, com pico entre 15 e 19 anos e responde por 30% da causa de morte por câncer de ovário nessa idade. Apresenta-se como massa pélvica calcificada, metrorragia ou dor pélvica. Relatamos caso de puberdade precoce periférica por teratoma ovariano tratado em ambulatório especializado. DESCRIÇÃO DO CASO: LSO, 3 anos, com história de telarca, clitoromegalia e dois episódios de metrorragia há dois meses. Ao exame: bom estado geral, corada, Tanner M4P1 com clitóris de 1,5 cm e massa abdominopélvica em quadrante inferior direito, ovalada, de consistência endurecida, móvel e 7 cm de diâmetro. Ao ultrassom evidenciou-se massa ovariana com 10,6x4,8x8,3cm. Alfetoproteína elevada e ao mesmo tempo LH e FSH normais. Paciente submetida a laparotomia onde foi ressecado tumor ovariano sólido-cístico. Histopatológico identificou teratoma imaturo ovariano de baixo grau sem envolvimento de estruturas adjacentes. Evoluiu satisfatoriamente com involução do Tanner e normalização dos exames laboratoriais após a ressecção. COMENTÁRIOS: O teratoma imaturo unilateral representa 90% dos casos e apresenta uma sobrevida de 93,6 % em cinco anos. O grau de imaturidade celular é definido através do anatomopatológico e consiste num fator prognóstico adverso, com índice de recidiva alto quanto maior o grau de imaturidade. Esses fatores justificam a necessidade de diagnóstico precoce, elevando as taxas de cura e a preservação de fertilidade destas pacientes.