12º COBRAPEM
Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia e Metabologia
31 de maio a 03 de junho de 2017
Rio de Janeiro . RJ

Trabalhos Científicos

Título: Displasia Septo-Óptica - Quando Suspeitar?

Autores: NAYARA RODRIGUES DA SILVA; TÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE MATTOS; JULIANE SAUTER DALBEM; MARCELO MULLER DE ARRUDA

Resumo: A Displasia Septo-óptica , também conhecida com Síndrome de Morsier, é uma condição congênita rara, apresentando a tríade clínica que compreende defeito da linha média, hipoplasia do nervo óptico e insuficiência hipotálamo-hipofisárias. Descrevemos um caso de Displasia septo-óptica em um paciente de 10 anos, apresentando hipoglicemia associado a crises epilépticas sintomáticas agudas, icterícia prolongada e micropênis desde o nascimento. O exame físico com baixa estatura, diminuição da acuidade visual, micropênis, atraso de linguagem e cognitivo, poliúria e polidipsia. A Ressonância magnética mostrou agenesia de septo pelúcido e hipoplasia de quiasma óptico e do nervo óptico, e hipófise hipoplásica, além de apresentar deficiência de hormônios antidiuréticos e dos eixos somatotrófico, adrenocorticotrófico e tireotrófico. Embora rara, a Displasia Septo-óptica é causa importante de hipopituitarismo congênito, devendo ser considerada em crianças com hipoplasia de nervo óptica ou defeito de linha média para seu diagnóstico e tratamento precoce, evitando sequelas e reduzindo a morbidade-mortalidade.

http://anais.sbp.com.br/trabalhos-de-congressos-da-sbp/12-congresso-brasileiro-peditrico-de-endocrinologia-e-metabologia/0128-displasia-septo-optica-quando-suspeitar.pdf