



12º COBRAPEM

Congresso Brasileiro Pediátrico
de Endocrinologia e Metabologia

31 de maio a 03 de junho de 2017

Rio de Janeiro . RJ

Trabalhos Científicos

Título: Diagnóstico De Carcinoma Papilífero De Tireoide Em Bócio Volumoso E Irregular

Autores: BEATRIZ FERNANDES; MARILENA CORDEIRO; JULIANE ROCHA; BIANCA BALASSIANO; DANIEL GILBAN

Resumo: O câncer infantil de tireoide é uma doença rara (0,54/100000 pessoas) com excelente prognóstico. Em crianças, está presente em estágios mais avançados e associa-se a taxas mais elevadas de recorrência. J.G.F.S, 14 anos, sexo feminino, encaminhada pela pediatra pelo surgimento de bócio há 10 meses. Refere constipação intestinal, sono em excesso, pela seca, queda de cabelo e com ritmo menstrual regular. Sem demais dados relevantes na história. Exame Físico: Tireóide aumentada 3 vezes, endurecida, com superfície irregular, apresentando nódulo palpável de cerca de 1 cm em lobo direito em 1/3 inferior com consistência firme e nódulo de 0,5cm em 1/3 superior em lobo esquerdo com consistência aumentada. Apresentava linfonodos palpáveis em cadeia cervical. Laboratório com TSH 5,07mUI/L T4L 1,3ng/dL anti-TPO >600UI/ml Anti-tireoglobulina 863UI/mL. PAAF realizada sendo puncionados 2 nódulos em lobo direito com resultado de Bethesda III e IV. Tireoidectomia realizada evidenciando carcinoma papilífero em lobo direito, microcarcinoma papilífero em lobo esquerdo e acometimento metastático de linfonodos. Administrado I131 para ablação. Em rastreamento pós dose de I131 houve hipercaptação anormal em região de hipofaringe de aspecto focal e moderada intensidade. Apesar desse resultado, paciente segue apenas em acompanhamento. Com o carcinoma papilífero se apresentando em estágios mais avançados em crianças, a suspeição feita pela pediatra acelera o tratamento, elevando as possibilidades de cura. Sendo assim, é imprescindível ao pediatra o conhecimento sobre as tumorações tireoidianas e como conduzir, antes mesmo do especialista.