



DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2014  
HOTEL PRODIGY . ARACAJU . SERGIPE

## Trabalhos Científicos

**Título:** Morbimortalidade Hospitalar Entre Adolescentes E Jovens Pelo Consumo De Bebidas Alcoólicas No Estado De Sergipe, De 1999 A 2011.

**Autores:** LARISSA FRANCELINA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE ); ANNA KLARA BOHLAND (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE ); JOSÉ RODRIGO SILVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE )

**Resumo:** Objetivo. Foi realizado um levantamento epidemiológico sobre a morbimortalidade hospitalar em Sergipe, de 1999 a 2011, tendo como causa de internação o consumo do álcool, na idade entre 10 e 24 anos. Metodologia. Foram selecionadas as categorias da Classificação Internacional de Doenças (CID 10r) relacionadas ao consumo de álcool. Utilizou-se o banco do Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS) e, para a tabulação, o programa TABWIN. Resultados. Foram registradas 901 internações em Sergipe tendo como causa o consumo de álcool. As principais causas foram os transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (F10 com 95,2%) e a doença alcoólica do fígado (K70 com 3,1%). Dos 858 casos com F10, foram do sexo masculino 95,7%. Das faixas etárias, a classe de 20-24 anos foi mais frequente (89,3%), seguida dos 15-19 anos (9,8%). Quanto à residência, se destacou a Regional de Saúde (RS) de Aracaju com 429 casos (50,0%), seguida da RS de Nossa Senhora do Socorro com 150 (17,5%). Não foram documentados óbitos por F10. A taxa de morbidade hospitalar por F10 foi decrescente, sendo a média 10,8/100.000 habitantes de 10 a 24 anos. Por outro lado, foram registradas 28 internações por K70 e seis óbitos (21,4%), sendo masculinos 66,7%, dos 20-24 anos com 67,9% e dos 15-19 anos com 28,6%. A taxa de morbidade hospitalar média por K70 foi de 0,4/100.000 habitantes na idade. Conclusão. Há necessidade de incrementar ações de educação em saúde para diminuir a morbimortalidade por uso do álcool entre os adolescentes e adultos jovens sergipanos.