DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2014
HOTEL PRODIGY . ARACAJU . SERGIPE

Trabalhos Científicos

Título: Risco De Suicídio Entre Adolescentes Com Sintomas De Bulimia Nervosa

Autores: JULIANA LOURENÇO (UFPE); BRUNA FERREIRA (UFPE-CAV); ROSANA XIMENES (UFPE-CAV); FLÁVIA NASSAR (UFPE); EVERTON BOTELHO (UFPE)

Resumo: Objetivo: Estimar a prevalência do risco de suicídio em adolescentes com sintomas de bulimia nervosa, e comparar os dados com a literatura científica relevante. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo com abordagem quantitativa; desenvolvido na cidade de Vitória de Santo Antão, Zona da Mata do Estado de Pernambuco-Brasil, entre setembro e novembro de 2012. Para a coleta de dados foram utilizados os instrumentos: Questionário de dados socioeconômicos e demográficos; Teste de Avaliação Bulímica de Edinburgh (BITE - "Bulimic Investigatory Test of Edinburgh") e o Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I. - versão brasileira 5.0.0) – Módulo C – risco de suicídio, aplicados a 139 adolescentes na faixa etária de 10 a 17 anos de idade, devidamente matriculados na rede pública de ensino. Resultados: Os achados evidenciaram que a maioria dos adolescentes tinha entre 14 e 17 anos, eram do sexo feminino e com baixo nível socioeconômico. Cerca de 30% dos adolescentes com risco de suicídio apresentaram sintomas positivos para bulimia nervosa. Conclusões: Os transtornos alimentares contribuem significativamente para o risco de suicídio em adolescentes; particularmente nos casos de bulimia nervosa, principalmente entre aqueles que utilizam uma compensação múltipla de comportamentos purgativos.