



DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2014
HOTEL PRODIGY . ARACAJU . SERGIPE

Trabalhos Científicos

Título: Perfil De Gestantes Adolescentes E De Seus Respectivos Recém Nascidos Em Um Hospital Público Terciário Da Baixada Santista

Autores: MALEK MOUNIR IMAD (UNILUS); LUCAS DE SENNA LEME (UNILUS); EDUARDO MORALES DE CAMARGO (UNILUS); ELLEN DE OLIVEIRA DANTAS (UNILUS)

Resumo: Objetivos: Analisar o perfil das adolescentes grávidas em um hospital público terciário da Baixada Santista. Métodos: Estudo descritivo, retrospectivo, transversal de análises de prontuários de mães adolescentes com parto entre janeiro a dezembro de 2013. Resultados: A taxa de adolescentes grávidas foi de 16,32% e divididas em dois grupos de intervalo de idade: 10 a 15 anos (1,61%) e 16 a 19 anos (12,36%). Quanto a escolaridade, 25,46% não conseguiram completar o Ensino Fundamental ou não souberam responder. Foram procedentes das principais cidades da Baixada Santista 97,22% das adolescentes e 79,71% realizaram um pré-natal adequado. De todas as mães, 77,31% eram primigestas e não houve diferença significativa entre os dois grupos etários. Observou-se que 51,85% das gestantes apresentaram ao menos um tipo de intercorrência ao longo da gestação. A prevalência do parto normal foi de 56,02%. A prevalência das complicações obstétricas foi de aproximadamente 29% sendo que a distócia de trajeto foi a intercorrência mais freqüente (10,9%). Em relação aos recém-nascidos, 10,18% foram prematuros, e 13,8% evoluíram com complicações sendo que a mais prevalente foi o sofrimento fetal (8,15%). A média de recém-nascidos de baixo peso foi de 11,57%. Verificou-se um aborto, cinco casos de natimortos e dois de óbito fetal. Apresentaram Apgar do 5º minuto abaixo de sete 3,3% dos recém-nascidos. Conclusão: A prevalência de adolescentes entre as gestantes internadas, para realização de parto, foi semelhante à encontrada em instituições equivalentes. Não foram identificadas influências da idade materna na prematuridade, ocorrência de baixo peso, Apgar, intercorrências clínicas e no óbito do recém-nascido.