



DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2014
HOTEL PRODIGY . ARACAJU . SERGIPE

Trabalhos Científicos

Título: Estudo De Fatores Associados à Infecção Pelo Hiv/aids Entre Adolescentes E Adultos Jovens Registrados Em Centro De Testagem E Aconselhamento No Estado Da Bahia

Autores: BIANCA DE SOUZA PEREIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA); MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA); JUCIELMA DE JESUS DIAS (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA); MAGALI TERESÓPOLIS REIS AMARAL (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA); HERVÂNIA SANTANA DA COSTA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA); CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA); VANESSA SILVA SAMPAIO (CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL EM DST/HIV/AIDS)

Resumo: Objetivo: pesquisar fatores relacionados à infecção pelo HIV entre adolescentes e adultos jovens (13 a 24 anos), de ambos os sexos, registrados no Centro de Testagem e Aconselhamento/CTA de Feira de Santana, Bahia/Brasil. Método: estudo observacional com delineamento transversal, Os dados foram coletados do Sistema de Informação do CTA (SI-CTA) no período de 2007 a 2011. Foram processadas informações de 3.768 indivíduos, sendo verificada a diferença de proporções, com Qui-quadrado (χ^2) de Pearson ($p < 0,05$) e análise estratificada, através da Razão de Prevalência/RP, com Intervalos de Confiança (IC) de 95%, considerando como desfecho o status sorológico. Resultados: no período estudado, 73 jovens estavam infectados pelo HIV (prevalência de 1,94%), na população geral de adolescentes e jovens , sendo 3,0% no sexo masculino e 1,6% no sexo feminino. Na população feminina, foram identificadas associações, estatisticamente significantes, para soropositividade e consumo de drogas (RP=2,1 IC=1,15-3,8), consumo de bebidas alcoólicas (RP=2,13 IC=1,16-3,91) e outras drogas (RP=6,72 IC=3,67-12,28); estar casada ou em união estável (RP=2,02 IC=1,09-3,75). No sexo masculino, associaram-se com a soropositividade o consumo de outras drogas (RP=13,25 IC=3,26-21,78) e orientação homossexual/bissexual (RP=5,21 IC=2,57-10,57). Em ambos os sexos, na categoria com parceiro estável, a soropositividade mostrou associação com companheiro usuário de drogas e/ou portador de DST e/ou HIV. Conclusões: Esses achados sinalizam a necessidade de medidas eficazes no controle e prevenção da infecção pelo HIV, principalmente entre jovens.