DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2014
HOTEL PRODIGY . ARACAJU . SERGIPE

Trabalhos Científicos

Título: Avaliação Das Internações Por Condições Sensíveis à Atenção Primária De Adolescentes Em Sergipe: De 2002 A 2004 E 2010 A 2012

Autores: JOSE RODRIGO SANTANA SILVEIRA (UFS); ANNA KLARA BOHLAND (UFS); ELEONORA RAMOS DE OLIVERA RIBEIRO (UFS); LARISSA FRANCELINA SILVA (UFS)

Resumo: Objetivo. Comparar as Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) dos adolescentes de Sergipe em dois períodos. Metodologia. A partir do DATASUS (SIH-SUS) selecionou-se a lista de ICSAP, baseada na Classificação Internacional de Doenças (CID-10r). Os casos foram descritos em dois períodos (1º-2002-2004 e 2º-2010-2012) e avaliados segundo a causa, sexo, idade, letalidade, custo da internação, regional de residência e de ocorrência. Resultados. Do total de internações foram por ICSAP 30,5% no 1º período e 20,1% no 2º. Dos casos, 54,2% foram femininos no 1º período e 58,1% no 2º. Quanto a idade ocorreram 51,3% em menores de 15 anos no 1o e 52,3% no 2º período. As causas mais frequentes foram do aparelho respiratório (1o: 40,7% e 2o: 36,2%), algumas doenças infecciosas e parasitárias (1o: 26,5% e 2o:20,3%) e do aparelho geniturinário (1o:12,0 % e 2o: 14,4%). As doenças da pele e tecido subcutâneo e ás relacionadas a gravidez, parto e puerpério apresentaram acréscimo de 40,3% e 86,3%. Quanto à letalidade (1o: 8,2 e 2º: 13,5 por 1000 internações) houve acréscimo de 65,0%. O custo da internação apresentou acréscimo de 98,0% (1o: R$ 270,10 e 2º: R$ 534,91). A regional de Propriá apresentou as maiores taxas de internação (1o: 60,9 e no 2o: 44,9 por 100.000 hab.). A regional de ocorrência no 1o período foi a de residência em 86,6%, e, no 2o de 79,2%. Conclusão. O estudo indicou que após a expansão quantitativa da ESF, há necessidade de consolidar ações que levem à qualificação das equipes.