



DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2014
HOTEL PRODIGY . ARACAJU . SERGIPE

Trabalhos Científicos

Título: Relato De Caso: Hiperplasia Suprarrenal Congênita Clássica, Perdedora De Sal

Autores: GIULIANA ROSENDO DE OLIVEIRA (PUC - PR); EMANUELLA STELLA MIKILITA (PUC - PR); FERNANDA HENRIQUES CAMELO (PUC - PR); FERNANDA SCHIER FRAGA (PUC - PR); LUCIMARY DE CASTRO SYLVESTRE (PUC - PR); DARCI VIEIRA DA SILVA BONETTO (PUC - PR)

Resumo: Introdução: Este trabalho relata duas irmãs que apresentam hiperplasia suprarrenal congênita (HSC). A HSC resulta de erro no metabolismo dos esteroides. O risco de recorrência entre irmãos de pais heterozigotos é 25%. Descrição de caso: Caso 1 KIC, 18 anos, feminino, genitália ambígua ao nascimento; realizado cariótipo. Aos três meses, iniciou crises de desidratação grave e aos seis foi diagnosticada com HSC, forma perdedora de sal, iniciando prednisona. Cirurgia para abertura do canal vaginal aos dez meses, ampliação com enxerto cutâneo autólogo aos seis anos, vaginoplastia aos onze e sucessivas dilatações. Aos sete anos apresentou sinais de puberdade precoce e idade óssea de onze, usando análogo de LhRh por quatro anos. Menstruou aos onze anos após indução hormonal. Hipertensa desde 2011. Caso 2 AC, 9 anos, feminino, pré-natal de alto risco por suspeita de feto com HSC. Nasceu com hiperpigmentação cutânea e genitália ambígua. Confirmada HSC na UTI, foi tratada precocemente com hidrocortisona e fluorhidrocortisona. Cirurgia para genitália ambígua com um ano e vaginoplastia aos quatro. Mãe relata recorrência de pneumonia e crises adrenais até ajuste medicamentoso. Com sete anos apresentou sinais de puberdade precoce e idade óssea de onze. Atualmente, usa análogo de LhRH e nega menarca. Hipertensa desde 1,6 anos. Comentários: Devido às varias cirurgias para correção anatômica faz-se necessário observar perfil emocional e desenvolvimento psicossocial. Fertilidade, sexualidade e menstruação devem ser abordadas com esses pacientes no início da adolescência. Destaca-se, portanto, a importância do diagnóstico precoce e da multidisciplinaridade no tratamento desta enfermidade.