



DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2014
HOTEL PRODIGY . ARACAJU . SERGIPE

Trabalhos Científicos

Título: Uso De álcool, Cigarro, Drogas Ilícitas E Função Sexual Em Adolescentes Com Artrite Idiopática Juvenil

Autores: LÍGIA BRUNI QUEIROZ (INSTITUTO DA CRIANÇA HC/FMUSP); MARLON VAN WEELDEN (INSTITUTO DA CRIANÇA HC/FMUSP E VU UNIVERSITY MEDICAL FACULTY, AMSTERDAM, THE NETHERLANDS); BENITO LOURENÇO (INSTITUTO DA CRIANÇA HC/FMUSP); GABRIELA R. VIOLA (INSTITUTO DA CRIANÇA HC/FMUSP); NADIA E AIKAWA (INSTITUTO DA CRIANÇA HC/FMUSP); CLOVIS A. SILVA (INSTITUTO DA CRIANÇA HC/FMUSP)

Resumo: Objetivo: Avaliar uso de álcool, tabagismo e drogas ilícitas em adolescente com AIJ e controles saudáveis. Métodos: 174 adolescentes com doenças reumáticas pediátricas foram selecionados. Destes, 54 adolescentes com AIJ e 35 controles participaram. Este estudo transversal avaliou dados demográficos/antropométricos e marcadores de puberdade. Um questionário estruturado analisou função sexual, uso de álcool/tabagismo/drogas ilícitas e bullying. A versão para português do instrumento CRAFFT foi realizado. Os dados clínicos, laboratoriais e tratamentos de pacientes com AIJ também foram avaliados. Resultados: A média da idade atual foi semelhante entre pacientes com AIJ e controles [15(10-19) vs. 15(12-18)anos, $p=0,506$]. Frequências de álcool/tabagismo/drogas ilícitas foram elevadas e semelhantes em AIJ e controles (43% vs. 46%, $p=0,829$). No entanto, a idade de início de álcool foi significativamente maior nos pacientes com AIJ [15(11-18) vs. 14(7-18)anos, $p=0,032$], particularmente nos pacientes com início poliarticular ($p=0,040$). Alto risco para o abuso de substâncias/dependência (CRAFFT pontuação ≥ 2) foi encontrado em ambos os grupos (13% vs. 15%, $p=1,000$), assim como o bullying ($p=0,088$). Uma análise dos pacientes com AIJ em relação álcool/tabagismo/drogas ilícitas mostrou que a mediana da idade atual [17(14-19) vs. 13(10-19)anos, $p<0,001$] e anos de escolaridade ($p<0,001$) foram significativamente maiores naqueles que utilizaram estas substâncias. Atividade sexual foi também significativamente mais elevada nos que utilizaram álcool/tabagismo/drogas ilícitas (48% vs. 7%, $p<0,001$). Uma correlação positiva foi evidenciada entre escore CRAFFT e idade atual dos pacientes com AIJ ($p=0,032$, $r=0,296$). Dos pacientes com AIJ com CRAFFT ≥ 2 : 5 usavam metotrexate e 6 agentes biológicos. Conclusão: Um alto risco de abuso/dependência de drogas foi observado em pacientes com AIJ. Os pacientes com AIJ que utilizam álcool/tabagismo/drogas ilícitas eram mais velhos e sexualmente ativos. Portanto, sugere-se que estas avaliações sejam incorporadas na rotina dos Reumatologistas Pediátricos.