



DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2014  
HOTEL PRODIGY . ARACAJU . SERGIPE

## Trabalhos Científicos

**Título:** Uso De álcool, Cigarro E Drogas Ilícitas Em Adolescentes Com Lupus Eritematoso Sistêmico Pediátrico

**Autores:** BENITO LOURENÇO (UNIDADE DE ADOLESCENTES DO INSTITUTO DA CRIANÇA DA FMUSP); MARLON VAN WEELDEN (UNIDADE DE REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA FMUSP); LIGIA BRUNI QUEIROZ (UNIDADE DE ADOLESCENTES DO INSTITUTO DA CRIANÇA DA FMUSP); DANIELA MENCARONI RODRIGUES LOURENÇO (UNIDADE DE REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA FMUSP); KATIA KOZU (UNIDADE DE REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA FMUSP); CLOVIS ARTUR SILVA (UNIDADE DE REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA FMUSP)

**Resumo:** Objetivo: Avaliar uso de álcool/fumo/drogas em adolescentes com LESp e controles saudáveis. Métodos: 174 adolescentes com doenças reumáticas foram selecionados. Destes, 34 adolescentes com LESp foram analisados e comparados com 35 controles saudáveis. Um estudo transversal avaliou dados demográficos, marcadores de puberdade e antropometria. Um questionário estruturado incluiu função sexual, uso de álcool/tabagismo/drogas ilícitas e bullying. Versão para português do instrumento CRAFFT foi realizado. Os dados clínicos, laboratoriais e tratamentos do LESp também foram avaliados. Resultados: Excelente confiabilidade do questionário foi observada no teste-reteste (teste de McNemar,  $p=1,0$ ). A mediana da idade atual foi semelhante entre pacientes com LESp e controles [15(12-18) vs. 15(12-18) anos,  $p=0,563$ ], assim como frequência do gênero feminino (76% vs. 74%,  $p=0,833$ ). A mediana da idade da menarca foi significativamente maior em pacientes com LESp versus controles [12(10-15) vs. 11,5(9-15) anos,  $p=0,041$ ], particularmente naquelas que o lúpus ocorreu antes da menarca [13(12-15) vs. 11,5(9-15) anos,  $p=0,007$ ]. O consumo de álcool foi alto e semelhante em pacientes e controles (38% vs. 46%,  $p=0,628$ ). Uso de cigarro (3% vs. 14%,  $p=0,198$ ) e maconha (0% vs. 6%,  $p=1,000$ ) foram menores e similares nos dois grupos. Uma tendência estatística de menor frequência de CRAFFT?2 foi evidenciada em pacientes com LESp versus controles (0% vs 15%,  $p=0,053$ ). Bullying foi relatado de forma semelhante nos dois grupos (43% vs. 36%,  $p=0,572$ ). Dados demográficos, marcadores de puberdade, função sexual, bullying, características clínicas/laboratoriais do LESp, atividade/dano cumulativo da doença e tratamentos foram similares nos pacientes com LESp que utilizaram álcool/tabaco/drogas ilícitas versus os que não utilizaram ( $p>0,05$ ). Conclusão: Este foi o primeiro estudo que mostrou alta frequências de uso precoce de álcool no LESp, com um baixo risco para diagnóstico de abuso/dependência nestes pacientes.