



DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2014
HOTEL PRODIGY . ARACAJU . SERGIPE

Trabalhos Científicos

Título: Tratamento Convencional Da Constipação Intestinal Crônica Funcional Em Adolescentes De 16 A 19 Anos, No Período De Seis Meses.

Autores: RITA CAROLINA NASCIMENTO RAMOS (UNIVÁS); ANNA LUIZA PIRES VIEIRA (UNIVÁS); THIAGO RAVANINI MOURÃO (UNIVAS); RAFAEL BARONI CARVALHO (UNIVAS); BRUNA SUELEN RAYMUNDO LUZ (UNIVAS); LUCIANA ALMEIDA (UNIVAS); MARIA APARECIDA SANTOS ARAÚJO (UNIVAS); EUGÊNIO MAGALHÃES (UNIVAS); SÔNIA MORATO (UNIVAS)

Resumo: OBJETIVO: Avaliar o efeito do tratamento convencional da constipação intestinal crônica funcional (CICF) e da orientação nutricional no período de seis meses. MÉTODOS: Estudo do tipo longitudinal, observacional, individual e descritivo, sendo aplicados dois instrumentos a todos pacientes encaminhados de uma triagem anterior composta por 449 estudantes de Pouso Alegre-MG. As consultas foram realizadas no ambulatório de proctologia do Hospital Das Clínicas Samuel Libânio (HCSL). As análises estatísticas foram exclusivamente descritivas através de proporções. RESULTADOS: Dos 14,7% dos adolescentes que foram encaminhados para consulta especializada e caracterizados como portadores de CICF, somente 15,1% dos diagnosticados compareceram e foram submetidos ao tratamento proposto. Nos 10 pacientes que foram submetidos ao tratamento convencional (com farelo de trigo e orientações), foi observado uma melhora no quadro das frequências evacuatórias e nas características das fezes. O calibre e a coloração das fezes não tiveram mudanças significativas. CONCLUSÃO: A inclusão do tratamento convencional para CICF mostrou-se eficaz no aumento da frequência evacuatória e na melhora da consistência fecal.