



DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2014
HOTEL PRODIGY . ARACAJU . SERGIPE

Trabalhos Científicos

Título: Sacroileíte Infecciosa Associada A Psoite : Relato De Um Caso

Autores: FLÁVIA THOMÉ MOREIRA (FACULDADE DE CIÊNCIAS MEDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO); BARABARA ARRAES GUEDES MACEDO (FACULDADE DE CIÊNCIAS MEDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO); GIOVANA CHEKIN PORTELLA (FACULDADE DE CIÊNCIAS MEDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO); SILVIA MARIA BALIEIRO NIGRO (FACULDADE DE CIÊNCIAS MEDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO); VERONICA COATES (FACULDADE DE CIÊNCIAS MEDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO); BENITO LOURENÇO (FACULDADE DE CIÊNCIAS MEDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO); ROGERIO PECCHINI (FACULDADE DE CIÊNCIAS MEDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO); MARIA JOSÉ CARVALHO SANT ANNA (FACULDADE DE CIÊNCIAS MEDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO)

Resumo: INTRODUÇÃO A SACROILEÍTE INFECCIOSA É UMA DOENÇA RARA, COM ENGANOSOS SINAIS CLÍNICOS QUE CONFUNDEM O DIAGNÓSTICO. POUCOS E ISOLADOS SÃO OS CASOS RELATADOS NA LITERATURA. NESTE TRABALHO, DESCREVE-SE O CASO DE UMA SACROILEÍTE INFECCIOSA ASSOCIADA A PSOÍTE EM UMA ADOLESCENTE, SUAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E EVOLUÇÃO. DESCRIÇÃO DO CASO IGGR, SEXO FEMININO, 12 ANOS, PROCUROU SERVIÇO DE EMERGÊNCIA COM QUATRO DIAS DE LOMBALGIA INCAPACITANTE ASSOCIADA A FEBRE. RELATAVA HISTÓRIA DE TRAUMA PREGRESSO LEVE NO LOCAL DA DOR . O EXAME FÍSICO, COMPROMETIDO PELA POUCA COLABORAÇÃO DA PACIENTE DEMONSTRAVA UMA RESTRIÇÃO DOLOROSA DA MOVIMENTAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES, PARTICULARMENTE NA REGIÃO DA ARTICULAÇÃO DO QUADRIL DIREITA. EMBORA REFERISSE DOR LOMBAR, NENHUM SINAL FLOGÍSTICO FOI OBSERVADO. DESDE SUA ADMISSÃO, A ADOLESCENTE MANTINHA-SE POLIQUEIXOSA, RESTRITA AO LEITO, DIFICULTANDO A AVALIAÇÃO CLÍNICA. NA INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA, IDENTIFICARAM-SE PROVAS INFLAMATÓRIAS ALTERADAS (VHS 120; PCR 14,3) E A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE QUADRIL EVIDENCIOU COLEÇÃO LÍQUIDA NO VENTRE ILÍACO ASSOCIADO A EDEMA NA MEDULA ÓSSEA SUBCONDRA E DERRAME ARTICULAR. REALIZOU-SE ANTIBIOTICOTERAPIA COM CEFTRIAXONA E OXACILINA, ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO E COM A EQUIPE DE MEDICINA DO ADOLESCENTE, POIS PACIENTE DESDE O INÍCIO APRESENTAVA NÍTIDO GANHO SECUNDÁRIO COM SEU QUADRO ALGICO. RECEBEU ALTA SEM NECESSIDADE DE ANALGESIA, APÓS TRINTA DIAS DE INTERNAÇÃO. COMENTÁRIOS O DIAGNÓSTICO DE SACROILEÍTE ASSOCIADA A PSOÍTE É DIFÍCIL DE SER ESTABELECIDO E IMPÕE VÁRIOS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS. AINDA NÃO EXISTE CONSENSO NA LITERATURA SOBRE O TEMPO DE ANTIBIOTICOTERAPIA, PRINCIPALMENTE NA ADOLESCÊNCIA, PERÍODO NO QUAL PODE OCORRER UMA VALORIZAÇÃO PSICOSSOMÁTICA DAS QUEIXAS.