



DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2014  
HOTEL PRODIGY . ARACAJU . SERGIPE

## Trabalhos Científicos

**Título:** Sangramento Uterino Disfuncional Em Adolescente Com Anorexia Nervosa

**Autores:** LÍGIA BRUNI QUEIROZ (INSTITUTO DA CRIANÇA HC/FMUSP); BENITO LOURENÇO (INSTITUTO DA CRIANÇA HC/FMUSP); LUIZ EDUARDO VARGAS DA SILVA (INSTITUTO DA CRIANÇA HC/FMUSP)

**Resumo:** Introdução: Anorexia nervosa é um transtorno que se apresenta com maior incidência na adolescência, cursando tipicamente com amenorreia como expressão de suas alterações endócrinas. Descreve-se um raro caso de Anorexia Nervosa em adolescente com hipermenorreia e anemia sintomática. Descrição do Caso: GBT, sexo feminino, 14 anos e 6 meses, admitida no Ambulatório de Adolescentes de um hospital terciário de São Paulo, com quadro de emagrecimento de 10 Kg em um período de 6 meses, com restrição alimentar, sem comportamentos purgativos. Notava-se preocupação excessiva com imagem corporal e com o peso. Ao exame físico de admissão, encontrava-se em estadiamento puberal de Tanner M5P5, IMC= 16,4 (OMS Score Z -1,6). Relatava um padrão menstrual hipermenorreico, com sangramentos abundantes, duração de até 30 dias e intervalos prolongados. GBT não apresentou amenorreia em momento algum durante o quadro de emagrecimento. Na investigação laboratorial da desordem menstrual, não apresentava alterações de coagulograma, prolactina, hormônios tireoidianos e ultrassonografia pélvica e o valor de Hb de entrada era 12,8mg/dL. Realizada hipótese diagnóstica de Anorexia Nervosa e sangramento uterino disfuncional e iniciado acompanhamento clínico e psiquiátrico. A paciente evoluiu com oscilações ponderais, mantendo o padrão menstrual e evoluindo, após cerca de um ano de acompanhamento, com quadro de anemia sintomática (Hb=7,9), necessitando de hemotransfusão. Desde então recebe suplementação de ferro e anticoncepcional hormonal oral combinado. Comentários: Não existem relatos na literatura de quadros hipermenorreicos em pacientes anoréxicas; pelo contrário, o padrão amenorreico é comumente encontrado. Chama a atenção nesse caso a necessidade transfusional e as repercussões psíquicas secundárias a esta intervenção.