



Trabalhos Científicos

Título: Questionário De Qualidade De Vida Em Crianças Brasileiras Com Alergia Alimentar

Autores: RENATA GUEDES DE CASTRO E CUNHA (HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II); ANALICE VAL PAULA (HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II); WILSON ROCHA FILHO (HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II); ROSILÉA ALVES SILVA (HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II)

Resumo: Objetivo: Testar-retestar o EuroPrevall; questionário de qualidade de vida e determinar a influência do acompanhamento nutricional, acesso a epinefrina e associação com dermatite atópica na qualidade de vida de pacientes com alergia alimentar. Também foi avaliado se pacientes com alergia IgE e não IgE mediada apresentavam diferenças na qualidade de vida. Metodologia: Estudo transversal e descritivo, desenvolvido através da aplicação de questionário específico a pacientes com diagnóstico confirmado de alergia alimentar. Dados foram coletados no período de um ano. As perguntas foram classificadas em três domínios: impacto emocional, ansiedade alimentar e limitações sociais e dietéticas. Após soma dos pontos, foi calculada uma média de cada domínio e em seguida, a média total do questionário. A pontuação final foi classificada em boa, regular e ruim qualidade de vida. Resultados: Foram analisadas 60 crianças com idade de 0 a 14 anos, todas acompanhadas no ambulatório referência de alergia alimentar. Observou-se que 22 (36,7%) pacientes foram classificados com melhor qualidade de vida, 28 (46,7%) com qualidade regular e apenas 10 (16,6%) com qualidade de vida ruim. Em relação a algumas variáveis analisadas como tipo de alergia, acompanhamento com nutricionista, kit de adrenalina disponível e associação com dermatite atópica, não foi evidenciada relação com a qualidade de vida. Conclusões: Questionário utilizado foi confiável para avaliar qualidade de vida em pacientes com alergia alimentar. Foi evidenciado grande número de crianças com qualidade de vida regular ou ruim. Não houve associação de melhor qualidade de vida com acompanhamento nutricional, acesso ao kit com epinefrina ou presença de dermatite atópica.