

**13°** CONGRESSO BRASILEIRO DE  
**ALERGIA E IMUNOLOGIA**  
**EM PEDIATRIA** 17 A 20 DE JUNHO . 2015  
HOTEL OTHON - SALVADOR - BA



### **Trabalhos Científicos**

**Título:** Epidemiologia Da Hepatite B, Um Estudo De Base Populacional Pediátrica No Brasil E No Estado Da Bahia, Nos últimos Sete Anos: A Necessidade De Melhorar Os Serviços De Diagnóstico E Abordagens De Gestão.

**Autores:** HELIMAR EMILIANO DOS SANTOS (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA)); ARMANDO SILVA MOURA (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA)); ISABELITA FERNANDES RIOS DE LIMA (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA)); MIRIAN PINTO COELHO DA SILVA MOURA (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA)); MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA)); ALANO MOURA ESTANISLAU DA SILVA (UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (RIO DE JANEIRO – RJ)); LÍVIA MARIA CALDAS RIBEIRO (INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (PORTO NACIONAL – TO)); LUCAS PEREIRA MOURA (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA)); LEILA CAMILA RIBEIRO SANTOS (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA))

**Resumo:** Introdução: Hepatite do tipo B (VHB) é uma doença infecciosa, chamada de soro homóloga. Por estar presente no sangue, espermatozoides e leite materno é considerada uma doença sexualmente transmissível. Objetivos: Analisar a prevalência e mortalidade por Hepatite B em pacientes pediátricos nas Regiões Brasileiras e Estado da Bahia, verificando o padrão de morbimortalidade anualmente. Metodologia: Estudo descritivo realizado através da análise de dados baseados na população pediátrica brasileira e Estado da Bahia, concernente aos internamentos e óbitos de pacientes com diagnóstico de Hepatite B entre 2008 a 2014 (DATASUS). Resultados: Obtivemos 879 casos e 24 óbitos em 84 meses. O maior número ocorreu em 2008 (178 casos, 05 óbitos) e 2013 a menor quantidade (90 casos, 00 óbitos). A Região Sul apresentou 76 casos (03 óbitos), seguida da Centro Oeste (80 casos, 01 óbitos), Sudeste (160 casos, 05 óbitos), Norte (225 casos, 04 óbitos) e Nordeste (338 casos, 11 óbitos). A Bahia apresentou 45 casos (01 óbito em 2011), sendo que a maior quantidade ocorreu em 2008, 10 casos. Conclusão: A ocorrência de Hepatite B aterroriza médicos, principalmente especialistas pediátricos. O Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam que a primeira dose da vacina deve ser aplicada nas primeiras 12 horas de vida. A segunda é realizada com 1-2 meses e a terceira dose é realizada aos 6 meses de idade. O conhecimento da sua ocorrência possibilita melhor entendimento da doença, implica melhor qualidade de vida dos pacientes e achados epidemiológicos ajudam na formulação das políticas de saúde e vacinação.