



Trabalhos Científicos

Título: Fpíes Aguda Grave Em Neonato, Associada A Síndrome De Heiner

Autores: FLÁVIA ALICE TIMBURIBÁ DE MEDEIROS GUIMARÃES (HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA); LISLIÊ CAPOULADE NOGUEIRA ARRAIS DE SOUZA (HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA); MALIRRA COLARES (HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA); VANESSA GONZAGA TAVARES GUIMARÃES (HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA); MÁRCIA CRISTINA MONDAINI SALAZAR (HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA); LÍVIA COSTA DE ALBUQUERQUE MACHADO (HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA); KHRISTIELLY TAVEIRA FIUZA (HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA)

Resumo: Introdução: A Síndrome da Enterocolite Induzida por Proteína Alimentar (FPIES) e a Síndrome de Heiner são formas menos frequentes de alergia alimentar. Ambas são manifestações não IgE mediadas. No entanto, a associação destas síndromes é pouco descrita na literatura. Estudos recentes demonstram aumento dos casos de FPIES nas últimas duas décadas. Quanto à Síndrome de Heiner, a literatura apresenta poucos relatos, provavelmente pela dificuldade no reconhecimento da doença. Descrição do caso: LGSL, 25 dias de vida, feminina, branca, internou com quadro de enterorragia, hemoptise, distensão abdominal, irritabilidade e choque hipovolêmico. Internada em UTI Neonatal com diagnóstico inicial de sepse, recebeu antibioticoterapia, dieta zero por 5 dias e, em seguida, introduzido hidrolizado protéico. Exames de entrada mostraram apenas leucocitose, ausência de coagulopatia e VHS normal. Todas as culturas realizadas em UTI foram negativas. O histórico alimentar, desde os primeiros dias de vida, envolvia leite materno suplementado por fórmula infantil para lactentes a base de leite de vaca. Após melhora clínica, já na enfermaria, a paciente foi submetida à estimulação oral por fonoaudióloga, com fórmula láctea e, cerca de 5 horas após, apresentou 3 episódios de vômitos e diarreia que durou 4 dias. Desde então, em uso de dieta elementar. A criança evolui bem, sem intercorrências, em 5 meses de acompanhamento ambulatorial. Comentários: o caso chama a atenção pela precocidade, gravidade e também pela associação de duas formas de alergia alimentar: sintomas graves da FPIES aguda simulando sepse, além de manifestações hemorrágicas pulmonares da Síndrome de Heiner.