

13° CONGRESSO BRASILEIRO DE
ALERGIA E IMUNOLOGIA
EM PEDIATRIA 17 A 20 DE JUNHO . 2015
HOTEL OTHON - SALVADOR - BA



Trabalhos Científicos

Título: Urticária Ao Frio Em Cuiabá-mt

Autores: CELSO TAQUES SALDANHA (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ); ALYSTON ALIPIO SIMAN TEIXEIRA (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ); BRUNA LEONOR BEZERRA (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ); JOSÉ FELIPE SCARLATI DOMINGUES (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ); JULIANA MORAIS BAGI (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ); LEINER EMANUELY TEIXEIRA SABORÉ (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ); RAFAEL PIMENTEL SALDANHA (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ); RODRIGO TEIXEIRA PELLINI (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ); VALDECIR SOARES (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ); VICTOR CLARINDO NOMINATO RIBEIRO (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ)

Resumo: Introdução: A urticária ao frio é caracterizada pelo súbito aparecimento de prurido e edema após a exposição ao frio, predominantemente no sexo feminino e pouco frequente na população pediátrica. Sua incidência é maior em regiões de clima frio. Descrição do caso: Adolescente, feminina, 13 anos de idade, vem apresentando episódios de urticárias desde os 7 anos de vida, principalmente durante o período que em Cuiabá o clima fica mais ameno (entre os meses de maio a julho). Relata ainda lesões urticariformes quando tomava banho no rio (água mais fria) e também quando consumia picolé e/ou sorvete (lábios ficavam “inchados”). Relata ainda alguns episódios de falta de ar e visão turva durante as manifestações urticariformes, tendo inclusive recebido atendimento em uma Unidade de Saúde. Nega outras patologias e uso de medicamentos regulares. Foi realizado teste com cubo de gelo em região anterior do braço direito, sendo observada no local testado da pele a formação de uma pápula eritematosa e pruriginosa. Comentários: Trata-se de um tipo de urticária física (urticária ao frio) resultado da aplicação de um estímulo físico sobre a pele, tendo apresentado alguns episódios urticariformes compatíveis com anafilaxia. Paciente foi orientada a evitar nadar em água gelada ou permanecer em ambientes refrigerados, além do uso de anti-histamínicos (quando necessário) e procurar serviço médico de urgência diante do quadro clínico sugestivo de reação anafilática.