

13° CONGRESSO BRASILEIRO DE
ALERGIA E IMUNOLOGIA
EM PEDIATRIA 17 A 20 DE JUNHO . 2015
HOTEL OTHON - SALVADOR - BA



Trabalhos Científicos

Título: Uso Contínuo De Corticóide Tópico Em Lactente Com Dermatite Atópica E Insuficiência De Crescimento

Autores: CELSO TAQUES SALDANHA (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ); ALLANA FONSECA SILVA (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ); ANA CAROLINA DA SILVEIRA MAIOLINI (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ); CAROLINA BELON ZAGO (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ); JOSÉ FELIPE SCARLATI DOMINGUES (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ); JULIANA MORAIS BAGI (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ); LEINER EMANUELY TEIXEIRA SABORÉ (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ); VALDECIR SOARES (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ); VICTOR CLARINDO CLARINDO NOMINATO RIBEIRO (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ); BRUNA LEONOR BEZERRA (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ)

Resumo: **INTRODUÇÃO:** Na pele dos lactentes existe uma maior relação entre superfície corporal e peso, e ainda capacidades metabólicas reduzidas, o que pode determinar maior concentração de metabólitos ativos, frente ao uso indiscriminado de corticoides tópicos nas dermatites atópicas. **DESCRIÇÃO DO CASO:** Lactente, masculino, um ano e dois meses de vida, nascido de parto cesário, a termo, peso e estatura adequados para a idade gestacional. No atendimento em ambulatório de alergia pediátrica, foram constatadas lesões de pele compatíveis com dermatite atópica e em uso contínuo (desde o primeiro trimestre de vida) da pomada Novacort®. Verificou-se ainda, no gráfico de crescimento, desaceleração acentuada do peso e estatura a partir do sexto mês de vida e, também, presença de pêlos faciais discretos. A dosagem do cortisol plasmático estava reduzida (0,54 mcg/dl). Genitores foram orientados a retirar, gradualmente, a medicação anti-inflamatória tópica e a utilizarem creme hidratante e Pimecrolimus tópico, obtendo-se, diante dessas orientações, recuperação evidente do crescimento pômbero-estatural. **COMENTÁRIOS:** A pomada utilizada inicialmente nas lesões eczematosas continha Dipropionato de Betametasona (classe II, potência alta), sendo que a sua utilização por longos períodos, ocasionou a absorção sistêmica e supressão do eixo hipotálamo-hipofisário. É importante enfatizar, portanto, que os efeitos colaterais dos corticoides tópicos ocorrem em geral pelo uso indevido dessa medicação, dose excessiva e potência incorreta.