

Trabalhos Científicos

Título: Epidemiologia Da Tuberculose Pulmonar, Um Estudo De Base Populacional Pediátrica No Brasil E No Estado Da Bahia, Nos últimos Sete Anos: A Necessidade De Melhorar Os Serviços De Diagnóstico E Abordagens De Gestão.

Autores: ARMANDO DA SILVA MOURA (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA)); HELIMAR EMILIANO DOS SANTOS (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA)); ISABELITA FERNANDES RIOS DE LIMA (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA)); MIRIAN PINTO COELHO SILVA MOURA (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA)); MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA)); LIVIA MARIA CALDAS RIBEIRO (INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (PORTO NACIONAL – TO)); ALANO MOURA ESTANISLAU DA SILVA (UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (RIO DE JANEIRO – RJ)); LUCAS PEREIRA MOURA (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA)); LEILA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (SALVADOR - BA))

Resumo: Introdução: Tuberculose Pulmonar é uma doença endêmica, infecciosa, causada pela Mycobacterium tuberculosis, que afeta principalmente os pulmões, podendo espalhar para outros órgãos. Transmitida pelo ar e perdigotos contaminados. Objetivos: Analisar prevalência e mortalidade por Tuberculose Pulmonar em pacientes pediátricos nas Regiões Brasileiras e Estado da Bahia, verificando o padrão de morbimortalidade anualmente. Metodologia: Estudo descritivo realizado através da análise de dados baseados na população pediátrica brasileira e Estado da Bahia, concernente aos internamentos e óbitos de pacientes com diagnóstico de Tuberculose Pulmonar entre 2008 a 2014 (DATASUS). Resultados: Obtivemos 4.096 casos. As regiões brasileiras representaram, em ordem decrescente: Sudeste (31,75%), Nordeste (30,14%), Sul (18,22%), Norte (11,49%) e Centro-Oeste (8,4%). Na Bahia foram registradas 351 internações, representando 23,73% do total para o Nordeste. Registrou-se no Brasil 121 óbitos, o Nordeste representou 29,75% (36 óbitos) e a Bahia registrou 10 óbitos (27,77% do total regional). A taxa de mortalidade média registrada no país foi de 2,47%, enquanto no Nordeste foi 2,43% e a Bahia apresentou 2,85%. Conclusão: A ocorrência de Tuberculose Pulmonar aterroriza médicos, principalmente especialistas pediátricos mesmo na atualidade. O Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam que a primeira dose da vacina deve ser aplicada logo após o nascimento, se não for possível deve ser ministrada após o 1° mês de vida. O conhecimento da sua ocorrência possibilita melhor entendimento da doenca, implica melhor qualidade de vida dos pacientes e achados epidemiológicos ajudam na formulação das políticas de saúde e vacinação.