



Trabalhos Científicos

Título: Diabetes Insipidus Central Na Infância: Perfil De Pacientes Acompanhados Em Um Hospital Terciário De Fortaleza-Ceará

Autores: ALESSANDRA LIMA VERAS DE MENEZES CAVALCANTE (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO), NANCY PEREIRA DANTAS LINHARES, RAISSA ALMEIDA BARROS DE OLIVEIRA PEREIRA, MAYARA TEIXEIRA ALEXANDRINO SALES, CAMILA SOUSA GONÇALVES, MILENA SILVA SOUSA, ANNELISE BARRETO DE CARVALHO, ANA PAULA DIAS RANGEL MONTENEGRO, LUCIANA FELIPE FÉRRER ARAGÃO

Resumo: Introdução: O Diabetes Insipidus Central (DIC) é uma patologia rara na infância, caracterizada pela presença de poliúria e polidipsia secundárias à deficiência do hormônio anti-diurético (ADH). Objetivos: Avaliar aspectos clínicos, laboratoriais e radiológicos do DIC em pacientes acompanhados em um serviço de Endocrinologia Pediátrica. Métodos: Estudo retrospectivo, realizado através de revisão de prontuários de pacientes com DIC. As informações foram registradas em uma planilha do excel. Resultados: Foram avaliados oito pacientes com DIC, sendo a média de idade ao diagnóstico de sete anos e a mediana entre o início dos sintomas e o diagnóstico de quatro meses. Os principais sinais e sintomas relatados foram poliúria (75) , polidipsia (75), nictúria (50) e perda de peso (37,5). Quatro pacientes (50) apresentavam mais de uma deficiência hipofisária. O achado mais comum da ressonância magnética foi a ausência do hipersinal em T1 da neuro-hipófise (62,5). Em relação à etiologia, um paciente apresentava diagnóstico de histiocitose de células de Langerhans (12,5), dois pacientes desenvolveram DIC após cirurgia de ressecção de craniofaringioma (25) e cinco pacientes apresentavam etiologia idiopática (62,5). Conclusão: É importante que seja realizado o diagnóstico precoce do DIC. O seguimento destes pacientes deve ser feito de forma regular, com objetivo de realizar tratamento adequado e detectar lesões intracranianas de aparecimento tardio.