



Trabalhos Científicos

Título: Carcinoma Diferenciado De Tireoide Em Crianças, Adolescentes E Jovens: Aspectos Clínicos E Prognóstico

Autores: PUÑALES MARCIA (SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA HOSPITAL CRIANÇA CONCEIÇÃO, INSTITUTO DA CRIANÇA COM DIABETES), BRUNA CAMASSOLA, JULIA MACCARINI, JOÃO CACCIATORI, CESAR GEREMIA, IRACEMA GONÇALVEZ

Resumo: Introdução: O carcinoma diferenciado da tireoide (CDT) é raro na infância e adolescência. Ao diagnóstico tem apresentação mais agressiva do que em adultos, com maior comprometimento linfonodal e à distância, porém exibe melhor prognóstico. Objetivos: Avaliar os aspectos clínico-laboratoriais e prognósticos do CDT em crianças, adolescentes e jovens. Materiais e Métodos: Foram incluídos no estudo pacientes com diagnóstico de CDT 8804, 21 anos. As características clínicas foram obtidas através da análise de prontuários da coorte de CDT do ambulatório de Câncer de Tireoide. Os pacientes foram classificados de acordo com a estratificação de risco pediátrico CDT da American Thyroid Association 2015 (risco ATA). Resultados: Do total (N=800) de prontuários avaliados, 44 pacientes apresentavam CDT 8804, 21 anos, sendo a idade ao diagnóstico de $16,7 \pm 3,7$ anos e 77,3 do sexo feminino. Ao diagnóstico, 66,7 dos casos apresentavam comprometimento linfonodal e 72,7 extensão extra-tireoidiana. A classificação histológica evidenciou carcinoma papilar em 84,1, folicular em 13,6 e misto (papilar e folicular) em 2,3. De acordo com a classificação de risco, 26,8 eram baixo risco, 36,6 risco intermediário e 36,6 alto risco. Durante o período de acompanhamento, 52,3 apresentaram critérios para livre de doença e não houve nenhum caso de morte. A presença de metástases linfonodais (90,0 versus 42,1, $p=0,002$) e a classificação de risco da ATA ($p=0,006$) foram critérios para não-livre de doença. Conclusão: Nossos resultados demonstram bom prognóstico da doença, com baixa taxa de recorrência, mesmo nos casos classificados como alto risco pelos critérios da ATA.