



14º Congresso Brasileiro de AdOLEScência

1º Congresso Brasileiro de
Áreas de Atuação em Pediatria

30/10 a 02/11 de 2016

Palácio Popular de Cultura
Campo Grande . MS

Trabalhos Científicos

Título: Síndrome Encefalopatia Neurogastrointestinal Mitocondrial (Mngie) Em Adolescente Com Diagnóstico Inicial De Anorexia Nervosa.

Autores: LÍVIA RODRIGUES DIAS DE PAIVA (); VIVIANNE HORTA DA SILVA (); VALÉRIA BARBOSA DE ANDRADE E SILVA ()

Resumo: INTRODUÇÃO: anorexia nervosa caracteriza-se por perda de peso intensa à custa de dietas rígidas, auto impostas, em busca desenfreada da magreza, distorção da imagem corporal, baixa autoestima e amenorreia. Pode associar-se a prática de exercícios físicos, uso de laxantes ou diuréticos (sintomas bulímicos). Encefalopatia mitocondrial neurogastrointestinal (MNGIE) é caracterizada pela associação dismotilidade gastrointestinal, neuropatia periférica, oftalmoplegia externa progressiva e leucoencefalopatia. Primeiras manifestações aparecem entre 10 e 40 anos. Sintomas são progressivos com manifestações gastrointestinais graves com motilidade intestinal anormal (cólicas, vômitos, diarreia, pseudo-obstrução, disfagia e gastroparesia). DESCRIÇÃO DO CASO: B.F.S., 18 anos, encaminhada ao setor de anorexia e bulimia de hospital público de Belo Horizonte em 25/09/15 com diagnóstico de anorexia há um ano. Queixa-se ausência de apetite, náuseas e vômitos pós-alimentares com pirose, fraqueza, tristeza, prostração e choro fácil. Sentia-se magra e insatisfeita com o corpo. Sexta de nove filhos de casamento consanguíneo com 2 irmãos falecidos por doenças do intestino (SIC). Internada para investigação de quadro de semi oclusão intestinal com tratamento cirúrgico com gastrectomia parcial. Diagnosticado condição rara, congênita, de herança autossômica recessiva: encefalopatia mitocondrial neurogastrointestinal (MNGIE). COMENTÁRIOS: Na MNGIE manifestações gastrointestinais progridem para pseudo-obstrução crônica levando a caquexia. Prognóstico é desfavorável devido à gravidade com necessidade de nutrição parentérica permanente. Anorexia é um diagnóstico diferencial importante a realizar para estabelecer modalidades terapêuticas que reduzem progressão da MNGIE, anamnese detalhada faz-se importante para início da propedêutica, avaliar paciente integralmente, analisar pontos psíquicos e orgânicos.