



# 14º Congresso Brasileiro de AdOLEScência

1º Congresso Brasileiro de  
Áreas de Atuação em Pediatria

30/10 a 02/11 de 2016

Palácio Popular de Cultura  
Campo Grande . MS

## Trabalhos Científicos

**Título:** Aplicação Do Questionário Psc (Pediatric Symptom Checklist) Em Crianças E Adolescentes

**Autores:** TAINARA CAETANO DALMINA (UNIOESTE-CASCADEL-PR); RENATA THOMAZINI DALLAGO (UNIOESTE-CASCADEL-PR); MAYSIA DOS SANTOS (UNIOESTE-CASCADEL-PR); ROBERTTA ZANDONÁ (UNIOESTE-CASCADEL-PR); INDINA PATRÍCIA BALEN (UNIOESTE-CASCADEL-PR); FERNANDA BREDT (UNIOESTE-CASCADEL-PR); MICHELLE SILVA ZENY (UNIOESTE-CASCADEL-PR); AMIR MOHANA (UNIOESTE-CASCADEL-PR); LUCAS THIESEN PIENKA (UNIOESTE-CASCADEL-PR); MATHEUS SANTANA SCHWAAB (UNIOESTE-CASCADEL-PR)

**Resumo:** Objetivos: O excesso de peso na infância e adolescência é um problema mundial, e as consequências da obesidade incluem condições patológicas frequentes como doenças crônicas e transtornos emocionais e psicossociais como bullying, ansiedade, depressão, entre outros, suscitando tratamento especializado e, posteriormente, reabilitação para reintegração social. O objetivo deste estudo foi avaliar o risco de transtornos emocionais e/ou psicossociais em crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade. Métodos: após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIOESTE, a coleta dos dados foi realizada através da aplicação de um questionário que avalia o risco de transtornos psicossociais e emocionais, o PSC (Pediatric Symptom Checklist), versão em português para crianças e adolescentes, de seis a 16 anos, com sobrepeso e obesidade, entre os meses de junho e agosto de 2016. Resultados: a idade variou de 6 a 16 anos. Foram obtidos avaliados 15 questionários respondidos, sendo 10 pacientes do sexo masculino e cinco do feminino. Entre os pacientes do sexo masculino, seis tinham IMC compatível com obesidade e quatro com sobrepeso. Somente dois pacientes apresentaram resultado positivo para transtorno emocional, sendo um obeso e um com sobrepeso. Entre as pacientes do sexo feminino, quatro tinham IMC compatível com obesidade e uma com sobrepeso. Duas meninas apresentaram pontuação compatível com transtorno emocional, sendo uma com sobrepeso e uma com obesidade. Conclusão: meninas demonstraram um maior risco de transtornos psicossociais e emocionais. Não houve diferença no risco de transtornos emocionais entre pacientes obesos e com sobrepeso em ambos os sexos.