



14º Congresso Brasileiro de AdOLEScência

1º Congresso Brasileiro de
Áreas de Atuação em Pediatria

30/10 a 02/11 de 2016

Palácio Popular de Cultura
Campo Grande . MS

Trabalhos Científicos

Título: Prevalência Dos Índices De Massa Corporal Dos Alunos Da Eeb Dr. Max Tavares D' Amaral Em Blumenau-Sc No Ano De 2016.

Autores: FRANCIELLY CARINE MARQUES LAUER (FURB - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU); JULIANA CECCONELLO (FURB - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU); RAFAELA ROEDEL (FURB - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU); MIRIA DE SOUZA EFFTING (MINISTÉRIO DA SAÚDE); EDUARDA FELSKY (FURB - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU); LUIZA FERREIRA DA SILVA (FURB - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU); KARLA FERREIRA RODRIGUES (FURB - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU)

Resumo: Objetivos: Esta pesquisa teve como finalidade o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) de jovens matriculados em uma escola estadual de Blumenau -SC. Através disso, poder analisar a prevalência deles em cada categoria preconizada por essa escala, comparando os dados por idade e sexo. Metodologia: Os dados foram obtidos por três acadêmicas de Medicina a partir de visitas pré-agendadas à escola. A amostra utilizada foi de 498 jovens, 207 do sexo feminino e 223 do sexo masculino, entre 6 e 17 anos. Considerou-se perda o aluno que faltou nos dois dias das visitas, totalizando 68. Resultados: Obteve-se aos 6 anos uma prevalência de 80% de peso normal. Aos 7, nesta mesma categoria, 62,79%. Aos 8, 63,88%. Aos 9, 77,7%. Aos 10, 52%. Aos 11, 54,05%. Aos 12, 65,78%. Aos 13, 69,44%. Aos 14, 67,3%. Aos 15, 70%. Aos 16, 77,77% e; aos 17, 100%. A amostra de 14 anos apresentou a maior prevalência nas categorias muito abaixo do peso (3,84%) e abaixo do peso (13,46%), enquanto a maior prevalência de sobrepeso foi aos 8 anos (25%) e obesidade aos 10 anos (32%). O sexo feminino em geral sobressaiu-se sobre o masculino somente na categoria peso normal. Conclusão: Observou-se, felizmente, que em todas as idades e sexos a maior prevalência foi na categoria peso normal. Entretanto, há índices muito elevados de sobrepeso e obesidade, principalmente dos 7 aos 11 anos, e de baixo peso principalmente aos 14, o que demanda uma proposta de intervenção pelo Sistema de Saúde local.