



14º Congresso Brasileiro de AdOLEScência

1º Congresso Brasileiro de
Áreas de Atuação em Pediatria

30/10 a 02/11 de 2016

Palácio Popular de Cultura
Campo Grande . MS

Trabalhos Científicos

Título: Pubarca Precoce Isolada Em Menina: É Sempre Uma Variante Da Normalidade?

Autores: EVERTON BRUNO CASTANHA (ACADÊMICO DE MEDICINA. FACULDADE DE MEDICINA. UFMT); GLENDA RAISSA MOL PACHECO (ACADÊMICO DE MEDICINA. FACULDADE DE MEDICINA. UFMT); RAIRA LUIZA PAES (ACADÊMICO DE MEDICINA. FACULDADE DE MEDICINA. UFMT); WILLIAM LOPES DANTAS DA SILVA (ACADÊMICO DE MEDICINA. FACULDADE DE MEDICINA. UFMT); GUSTAVO IGLESIAS AZEVEDO (ACADÊMICO DE MEDICINA. FACULDADE DE MEDICINA. UNINORTE. ACRE); ALDA ELIZABETH BOEHLER IGLESIAS AZEVEDO (PROF^a DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA. FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO); AUGUSTO BUENO AZEVEDO (AMBULATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER. UFMT E CEM/SES. MT)

Resumo: A pubarca ou adrenarca precoce é o aparecimento isolado pêlos pubianos e/ou axilares, antes dos 6 1/2 anos na menina, sem evidências de estrogenização, virilização. De etiologia desconhecida sugere-se a elevação da sensibilidade dos folículos dos pelos pubianos aos andrógenos ou aumento precoce da secreção dos andrógenos pela supra renal. Pode ser o primeiro sinal de tumor ou hiperplasia da supra-renal, tumor gonadal e precocidade isossexual verdadeira. Na maioria dos casos não se identificam alterações, sendo consideradas variantes da normalidade. Caso: NLPG, sexo feminino, 8 anos, procurou nosso serviço com diagnóstico de puberdade precoce há 3 anos. Aos 5 anos de idade inciam-se pêlos em região pubiana, axilas e membros inferiores, ganho de peso e aparecimento de suor com odor. PN: 2kg480g. 48cm. Exame físico: P: 28kg300g; E: 125cm. M1P2 (estágio puberal), pêlos axilares. Ausência de hipertrofia de clitóris. LH e FSH, LH, FSH, 17-OHP: sem alterações DHEA -SO4 de 51, 7 ug/dl (N:30), Estradiol 24,6 pg/ml (N: 18). TC Hipófise e US de pelve normal, idade óssea compatível com cronológica. Com diagnóstico de pubarca precoce isolada/idiopática vem sendo acompanhada com VC adequada e estágio puberal M1P3. Comentários: Casos de adrenarca prematura são caracterizados por níveis puberais de androstenediona e DHEA. Pubarca precoce tem sido associada com a criança que nasce pequena para a idade gestacional (PIG). O excesso de peso na infância pode predispor a pubarca precoce em indivíduos suscetíveis. A criança deverá ser reexaminada periodicamente para confirmar a impressão diagnóstica inicial e qualquer evidência de virilização ou efeito estrogênico obriga a reavaliação laboratorial, chama-se atenção pelo fato de que possa estar antecedendo um diagnóstico futuro de síndrome dos ovários policísticos, hiperandrogenismo ovariano funcional, resistência insulínica, obesidade.