



14º Congresso Brasileiro de AdOLEScência

1º Congresso Brasileiro de
Áreas de Atuação em Pediatria

30/10 a 02/11 de 2016

Palácio Popular de Cultura
Campo Grande . MS

Trabalhos Científicos

Título: Contraceção De Emergência Pílula Do Dia Seguinte

Autores: ALBERTINA DUARTE TAKIUTI (PROGRAMA SAÚDE ADOLESCENTE); JOANA M. SHIKANAI KERR (PROGRAMA SAÚDE ADOLESCENTE); LIA PINHEIRO (PROGRAMA SAÚDE ADOLESCENTE); LÉLIA SOUZA FERNANDES (PROGRAMA SAÚDE ADOLESCENTE); CAIO FABIO S. PORTELLA (PROGRAMA SAÚDE ADOLESCENTE); C. FERNANDA PADOVAN (PROGRAMA SAÚDE ADOLESCENTE); ROSANA RAMOS POÇO (PROGRAMA SAÚDE ADOLESCENTE); ALZIRA CIAMPOLINI LEAL (PROGRAMA SAÚDE ADOLESCENTE); EDMUND CHADA BARACAT (HOSPITAL DAS CLINICAS FMUSP)

Resumo: OBJETIVO: Verificar o conhecimento e uso da contraceção de emergência por adolescentes. MÉTODO: Pesquisa realizada com 200 adolescentes do sexo feminino (14 a 20 anos), em atendimento médico e multiprofissional de abril a junho de 2013. RESULTADOS: Idade média 16,8 anos. Menarca: 11,9 anos, atividade sexual: 15,1 anos. Tinham filhos 21(10,5%) . Tomaram conhecimento: escola 50%, amigos 43,5%, saúde 25%, família 21,5%, mídia 21%. Sabiam: evitaria gravidez 95%, máximo três vezes/ano 15,5%, efeitos colaterais 14%, tomar no dia seguinte à relação 13,5%, falhar 13,5%, excesso de hormônio 10%. Das 149 adolescentes em atividade sexual 63,8% haviam tomado pílula do dia seguinte. Porque tomaram: desprotegidas 61,5%, problema preservativo 30,7%, receiava engravidar 6,5%, violência sexual 1,1%. O que sentiram: 47% alteração menstrual, 33,8% medo, 23,5% ansiedade, 20,5% enjoos Adquirida: farmácia 93,5% e 6,5% serviço de saúde,. Não engravidaram: 92,4%. .CONCLUSÃO: Persistem muitas dúvidas quanto a ação, eficácia e modo de uso do levonorgestrel (pílula do dia seguinte). A escola tem um papel importantíssimo como agente difusor do conhecimento. Fica evidente a procura da medicação fora do setor da saúde. Nossos resultados indicam que é necessário informar o uso adequado da contraceção de emergência, bem como reforçar a utilização de métodos anticoncepcionais.