

14º Congresso Brasileiro de Ensino e Pesquisa 2014

9º CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA EM
SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2º CONGRESSO BRASILEIRO DE RESIDENTES DE PEDIATRIA

2º ENCONTRO NACIONAL DE LIGAS DE PEDIATRIA

14º FÓRUM DA ACADEMIA BRASILEIRA DE PEDIATRIA - Prof. Dr. Izrail Cat



Trabalhos Científicos

Título: Fatores De Risco E Gravidade Da Asma Em Crianças Da Rede Pública

Autores: PEDRO HENRIQUE SOUZA REIS (FUNORTE); IURI BRAGA DE OLIVEIRA (FUNORTE); ROSEANE DURÃES CALDEIRA (FUNORTE); ANDERSON FREDERICO OLIVEIRA DIAS (FUNORTE); PATRÍCIA PALMEIRA FREITAS (FUNORTE); JOÃO MARCUS OLIVEIRA ANDRADE (FUNORTE); JOÃO LUCAS SANTANA BENEVIDES (FUNORTE); RAFAEL INÁCIO POMPEU MENDES (FUNORTE); JOÃO PEDRO PAULINO RUAS (FIP-MOC); VITÓRIA BEATRIZ PRENAZZI DE PÁDUA (FUNORTE)

Resumo: OBJETIVO: Identificar os fatores de risco e a gravidade da asma em crianças asmáticas pertencentes a um projeto de asmáticos no município de Montes Claros – MG. METODOLOGIA: Estudo descritivo de natureza quantitativa e de corte transversal, no qual foram avaliadas 92 crianças, de ambos os gêneros que são cadastradas no projeto de asma. Foi utilizado um formulário para obtenção dos dados contidos nos prontuários dos pacientes e para entrevista com as mães. RESULTADOS: A média de idade das crianças avaliadas foi de $6,03 \pm 3,2$ anos. A renda familiar encontrada foi de 1 a 3 salários mínimos (76%). Dentre a população estudada, houve predominância do gênero masculino (61%). 47% apresentaram asma parcialmente controlada e/ou sem controle. O tempo de diagnóstico de asma prevaleceu entre 1 a 5 anos (63,3%). 29,3% das crianças apresentam pelo menos 01 familiar fumante. 43,5% das mães amamentaram as crianças mais de 1 ano de idade. 90,2% tiveram/têm contato com algum alérgeno. Verificou-se que 47% das crianças foram internadas pelo menos 1 vez devido à complicação da asma e, 37% foram ao pronto socorro no último mês. CONCLUSÃO: São diversos os fatores de risco que as crianças avaliadas estão expostas, dentre eles o fumo passivo e o contato com alérgenos. Observou-se que a renda familiar é baixa e, pelo fato de participarem de projeto com acompanhamento com Pneumologista apenas 37% das crianças recorreram ao pronto socorro no último mês.