

# 14º Congresso Brasileiro de Ensino e Pesquisa 2014

9º CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA EM  
SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2º CONGRESSO BRASILEIRO DE RESIDENTES DE PEDIATRIA

2º ENCONTRO NACIONAL DE LIGAS DE PEDIATRIA

14º FÓRUM DA ACADEMIA BRASILEIRA DE PEDIATRIA - Prof. Dr. Izrail Cat



## Trabalhos Científicos

**Título:** Perfil Das Doadoras De Leite Humano Ordenhado De Um Hospital Amigo Da Criança

**Autores:** ELISANGELA PESSOA DE ALMEIDA (HOSPITAL SOFIA FELDMAN)

**Resumo:** Introdução Os postos de coleta e os bancos de leite humano funcionam como incentivadores para a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, bem como motivadores na doação do excesso da produção materna. Objetivo Caracterizar o perfil de doadoras de leite humano ordenhado (LHO) de um hospital amigo da criança. Metodologia Foram utilizados dados secundários de 572 doadoras entre o período de 01 de janeiro 2012 a 30 de outubro de 2012 em um hospital filantrópico de Belo Horizonte. Resultados Verificou-se uma média de 57,2 ( $\pm 8,4$ ) doadoras/mês, sendo o maior número de doações realizadas no mês de outubro (71 doadoras = 12,4%) e o menor no mês de junho (43 doadoras = 8%). Foram 338 (59%) doadoras internas, ou seja, puérperas que estavam com seus filhos na unidade de terapia intensiva neonatal, nas unidades de cuidados intermediários ou no alojamento conjunto do hospital e 217 (38%) doadoras externas, ou seja, mulheres da comunidade que não necessariamente tiveram seus filhos no hospital, mas que tiveram o desejo de doar seu leite, excedente ao sustento do filho. A faixa etária predominante das doadoras externas e internas esteve entre 24-30 anos e 46% das mesmas se declararam solteiras. O volume de leite doado na primeira doação foi maior entre as doadoras externas quando comparado às nutrizas internas. Foi observada diferença estatisticamente significativa para essa variável entre os dois grupos ( $p < 0,001$ ). Em relação ao volume total de leite humano ordenhado doado no período, verificou-se que as nutrizas externas doaram maior volume (258.510ml) do que as internas (210.735ml), totalizando um volume de 469.245ml de LHO doado no período do estudo. Conclusão O trabalho evidenciou uma diferença entre as doações de nutrizas internas e externas do Hospital. Este resultado deve ser considerado na elaboração de estratégias que visem um maior número de doações, evitando assim, o desmame precoce, realizando o apoio e incentivo ao aleitamento materno.