

14º Congresso Brasileiro de Ensino e Pesquisa 2014

9º CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA EM
SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2º CONGRESSO BRASILEIRO DE RESIDENTES DE PEDIATRIA

2º ENCONTRO NACIONAL DE LIGAS DE PEDIATRIA

14º FÓRUM DA ACADEMIA BRASILEIRA DE PEDIATRIA - Prof. Dr. Izrail Cat



Trabalhos Científicos

Título: Percepção Do Suporte Familiar De Adolescentes Com Fibrose Cística

Autores: DAIANA COUTO PIRES (CIPED - FCM - UNICAMP); ALINE SANTAREM ERNESTO (CIPED - FCM - UNICAMP); POLIANY CRISTINA DE SOUZA (CIPED - FCM - UNICAMP); ADYLEIA APARECIDA DALBO CONTRERA TORO (CIPED - FCM - UNICAMP); PAULO DALGALARRONDO (DEP. PSICOLOGIA MÉDICA E PSIQUIATRIA - FCM - UNICAMP); MARIA MARLUCE DOS SANTOS VILELA (CIPED - FCM - UNICAMP); MARCOS TADEU NOLASCO DA SILVA (CIPED - FCM - UNICAMP)

Resumo: OBJETIVO: Avaliar a percepção de suporte familiar por meio de uma escala padronizada e validada, de adolescentes portadores de Fibrose Cística (FC), acompanhados em um centro de referência e comparar com grupo controle. MÉTODO: Estudo analítico, observacional e de corte transversal. Foi realizada a avaliação do vínculo paciente/cuidador, através de aplicação do Inventário de Percepção do Suporte Familiar - IPSF. Foram incluídos adolescentes (13 a 20 anos) em seguimento em serviço de referência em Fibrose Cística, e adolescentes saudáveis, alunos de escola pública, comparáveis em sexo e idade. A análise estatística foi realizada com o software SPSS, sendo as diferenças entre grupos comparadas pelo teste de Mann-Whitney. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local. RESULTADOS: O estudo avaliou 86 sujeitos, destes 40 (46,5%) eram pacientes, portadores de FC, sendo 21 (52,5%) do sexo feminino. A média de idade foi de 16,54 (\pm 2,23). Os outros 46 (53,48%) sujeitos, compunham o grupo controle, sendo 27 (58,7%) meninas, com idade média de 16,06 anos (\pm 1,48). Não houve diferenças entre os grupos, em relação a sexo e idade. O instrumento IPSF possibilitou avaliar quatro domínios inseridos no conceito de suporte familiar: afetivo-consistente; adaptação familiar; autonomia e geral. Não foi observada diferença estatisticamente significativa entre a percepção do suporte familiar do grupo com FC em comparação ao grupo controle, tanto no total, como no que diz respeito a cada domínio (medianas para IPSF total de 70 pontos no grupo FC e 60 pontos no GC, $p = 0,51$). CONCLUSÃO: Adolescentes com FC atendidos em serviços de referência apresentaram características psicossociais semelhantes a jovens saudáveis. Apesar da dinâmica do cuidado no tratamento da FC, exigir do cuidador importante dedicação e participação na vida do adolescente, não houve diferença na percepção destes adolescentes quanto ao suporte recebido da família, em comparação com a percepção de jovens saudáveis. Conhecer os fatores psicossociais envolvidos no manejo do tratamento poderá resultar em melhorias de qualidade da atenção à saúde de crianças e adolescentes.