

14º Congresso Brasileiro de  
**Gastroenterologia**  
**Pediátrica**  
05 a 9 de junho de 2012  
São Paulo - SP



### Trabalhos Científicos

**Título:** Constipação Intestinal Como Primeira Manifestação De Hipotireoidismo: Relato De Caso

**Autores:** BOÉ C, LOZINSKY AC, FORNARO TF, NUTELS ACG, TAHAN S, MORAIS MB, , , ,

**Resumo:** Introdução: Hipotireoidismo é uma das doenças hormonais mais frequentes em pediatria. Pode ocasionar constipação, sendo esta a primeira manifestação em um terço dos casos. O objetivo é relatar um caso de constipação grave como primeira manifestação clínica de hipotireoidismo. Relato de caso: Adolescente, sexo feminino, 10 anos e com quadro de aumento no intervalo entre as evacuações chegando a ficar 4 meses sem evacuar, dor no hipogástrio e incontinência fecal diária. Neste período apresentou anorexia e emagrecimento (20 Kg). Ao exame massa palpável endurecida em todos os quadrantes e toque retal sugestivo de fecaloma. Inicialmente feito esvaziamento do fecaloma e administrado laxante por via oral com controle do quadro (leite de magnésia 2ml/kg/dia). Os exames mostraram aumento do TSH (superior a 100µUI/mL – valor de referência 0,34 a 5,6) e diminuição de T4L (menor 0,2ng/dL – valor de referência 0,58 a 1,64), dosagem do anticorpo antitransglutaminase negativa. A manometria anorretal mostrou presença do reflexo reto-anal com aumento de sua duração. Feito diagnóstico de hipotireoidismo com constipação como único sintoma clínico. Introduzido L-tiroxina e acompanhamento com endocrinologia. Paciente apresentou melhora clínica rápida e significativa, hábito intestinal diário, com fezes pastosas e sem escape, não sendo mais necessário o uso do laxante. Comentários: Nos casos graves de constipação intestinal em crianças e adolescentes, a realização de exames para o diagnóstico diferencial entre causa funcional ou orgânica é fundamental para o tratamento correto.