

14º Congresso Brasileiro de
Gastroenterologia
Pediátrica
05 a 9 de junho de 2012
São Paulo - SP



Trabalhos Científicos

Título: Ascite Intratável Associada A Pericardite Constrictiva (pc) - Relato De Caso

Autores: NASCIMENTO T, BRANCO FR S, BOÉ C, LOZINSKY AC, PELLACANI B, AZEVEDO RA, MORAIS MB, MATTAR RHGM, ,

Resumo: Introdução: A ascite intratável é um desafio para o hepatologista pediátrico, não sendo um sinal exclusivo de manifestação hepática. Descrição do Caso: Paciente masculino, 17 anos, natural de Itauna/BA, procedente de Osasco. Queixa de aumento do volume abdominal desde 1 ano de idade. Sintoma esse, atribuído a parasitoses. História pregressa de meningite com 21 dias de vida, e diversas internações por anasarca secundária a hipoalbuminemia. Há 7 anos em investigação com hepatologia e com diagnóstico histológico de Esclerose Hepato-portal. Evoluiu com ascite de difícil controle, sem varizes esofágicas, função hepática preservada, exceto por hipoalbuminemia que se acentuava em vigência de infecções. Iniciou quadro de desconforto respiratório secundário a ascite volumosa, e foi internado para investigação diagnóstica. Submetido a endoscopia digestiva alta com aspecto sugestivo de linfangiectasia intestinal. Prosseguida investigação com ? 1 anti tripsina fecal aumentada, imunofenotipagem com diminuição de todas as linhagens, sem melhora com uso de dieta hipogordurosa. Apresentando abafamento de bulhas e turgência jugular foram realizados ecocardiograma, tomografia computadorizada de tórax e angioressonância de tórax evidenciando Pericardite Constrictiva. Indicado e realizado pericardiectomia sem intercorrências e com melhora clinicas dos sintomas anteriormente apresentados. Comentários: As manifestações clínicas da PC são decorrentes do comprometimento ventricular diastólico, da contratilidade miocárdica e consequente depressão da função cardíaca. A hepatomegalia e a ascite podem ser desproporcionais aos outros sinais e sintomas, sugerindo uma hepatopatia crônica. A enteropatia perdedora de proteínas, com hipoproteinemia e linfopenia podem acontecer na constrição intensa. A PC é uma etiologia de ascite intratável que deve ser sempre investigada.