

14º Congresso Brasileiro de  
**Gastroenterologia**  
**Pediátrica**  
05 a 9 de junho de 2012  
São Paulo - SP



### Trabalhos Científicos

**Título:** Dengue Hemorrágica E Hepatite Auto-imune: Um Relato De Caso

**Autores:** FLORES PP, PEREIRA CF, OLIVEIRA LM, SOARES M, NAVI NP, , , , ,

**Resumo:** A hepatite auto-imune apresenta-se clinicamente desde a forma silenciosa até quadro agudo e grave, cuja evolução leva à cirrose hepática em 80% dos casos quando não tratada. Responde bem ao corticoide, inclusive, utilizado como teste terapêutico. O diagnóstico depende de dados epidemiológicos, laboratoriais e da biópsia hepática. Paciente feminina, 15 anos, deu entrada no serviço de infectologia com queixas de dor retroorbitária, febre baixa, mialgia, cefaléia, dispneia aos médios esforços, tosse com hemoptoicos, distensão e dor abdominal além de icterícia. Apresentava teste rápido NS1 para dengue positivo, não confirmado por sorologias. Entre os exames realizados a tomografia computadorizada de tórax e abdome revelou hemorragia pulmonar extensa à direita, fígado de tamanho aumentado e heterogêneo além de esplenomegalia. A endoscopia digestiva demonstrou cordões varicosos de médio calibre. Exames laboratoriais demonstraram plaquetopenia, TAP alargado, elevação de bilirrubina sérica total e direta, sorologias para hepatite negativas, elevação de enzimas hepáticas, hipergamaglobulinemia policlonal, FAN positivo e aumento expressivo de imunoglobulina G (> 2 g/dl). A biópsia hepática não foi conduzida devido à discrasia importante, optando-se em realizá-la dentro de um mês após introdução de corticoide. O score de Hennes and aL (2008) foi de 6, ou seja, hepatite auto-imune provável e, assim, iniciou-se terapia para hepatite auto-imune com corticoide e azatioprina após um mês de profilaxia para tuberculose com isoniazida devido à PPD forte reator na avaliação clínica. Verifica-se importante agravamento de uma doença aguda de elevada incidência no Brasil, a dengue, por uma hepatite auto-imune, até então silenciosa, modificando o foco de atenção a esta paciente.