

14º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica

05 a 9 de junho de 2012
São Paulo - SP



Trabalhos Científicos

Título: Avaliação Da Concordância Da Intensidade De Dor Nos Pacientes Com Dor Abdominal Crônica Funcional E Suas Mães

Autores: SILVA DG, CARVALHO JUNIOR JD, SOUZA RPA, MELO LLS, MOTTA MEFA, LUCENA BL, , , ,

Resumo: Objetivo: avaliar a concordância entre a escala analógica visual e de faces revisada na dor abdominal crônica. Métodos: Foram estudadas crianças maiores de quatro anos e adolescentes com dor abdominal crônica funcional. O questionário ROMA III para diagnóstico dos subtipos de dor abdominal crônica funcional foi aplicado aos pacientes para definir diagnóstico. Foi utilizada a escala de face revisada, validada no Brasil. A escala analógica visual foi utilizada após adaptação transcultural (tradução, retrotradução, adaptação transcultural e pré-teste da versão final antes de sua aplicação). Pacientes e pais marcaram a face que melhor representava a intensidade de dor na escala de face revisada e um ponto na linha de 100 mm da escala analógica visual para indicar a intensidade de dor. O paciente e a mãe marcaram as duas escalas em salas separadas para verificar a concordância interobservador. Resultados: Foram estudadas 57 crianças e adolescentes, sendo 55,4% do sexo masculino, com média de idade de 8,04 +/- 3,26 anos. Observou-se forte concordância entre as duas escalas para as mães, e fraca concordância entre as duas escalas para os filhos. Não houve concordância entre as respostas da mãe e do filho para uma mesma escala. Conclusão: A dor crônica é difícil de ser mensurada. Ambos os métodos podem ser utilizados na avaliação de dor abdominal crônica, embora as respostas possam ser diferentes quando dadas pela mãe ou pelo paciente, refletindo a dimensão individual da dor.